



Octenisept®

Bezbolesna dezynfekcja ran, błon śluzowych i skóry



Skład

100g preparatu Octenisept zawiera:

- dichlorowodorek octenidyny - 0,1 g
- alkohol fenoksyetylowy - 2,0 g
- substancje pomocnicze: octan dimetyloamoniowy kwas amidopropylokokosowy, glukonian sodu, glicerol 85%.
- woda oczyszczona do 100 g

Właściwości użytkowe

Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi:

- w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, na oddziałach intensywnej terapii i oddziałach zakaźnych
- przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych
- przy opracowywaniu zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych

- przy płukaniu ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiaków, itp.
- przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych
- w obrębie narządów rodnych kobiety np. zapalenie pochwy i żołądźci prącia mężczyzny
- przed zabiegami diagnostycznymi w układzie moczowym
- przy cewnikowaniu
- przed badaniami dopochwowymi i pozapochwowymi
- przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie
- do pooperacyjnych i poporodowych irygacji pochwy przed założeniem IUP
- przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem
- przed badaniami andrologicznymi
- w pediatrii
- do dezynfekcji jamy ustnej np. afty, resekcja zęba.



Działanie preparatu

- bakteriobójcze (łącznie z MRSA, Chlamydia, Mycoplasma)
- grzybobójcze
- drożdżakobójcze
- pierwotniakobójcze (łącznie z Trichomonas)
- wirusobójcze (Herpes simplex, HBV i HIV)

Zalety preparatu

- gotowy do użycia antyseptyk do ran i błon śluzowych
- skuteczna alternatywa dla dotychczas stosowanych substancji aktywnych np. PVP - jod, organiczne związki rtęci
- dobrze tolerowany przez błony śluzowe i skórę, nie powoduje drażnienia ran
- bezbolesne stosowanie
- szybkie działanie
- efekt działania do 1 godziny
- substancje aktywne nie ulegają wchłanianiu
- bezbarwny, nie pozostawia plam

Sposób użycia

Octenisept zalecany jest do stosowania w postaci nie rozcieńczonej.

Odkazanie ran chirurgicznych

Skuteczność preparatu Octenisept potwierdzono także podczas opracowywania czystych i zakażonych ran chirurgicznych. Preparat łączy funkcje odkażające, analgetyczne i oczyszczające zakażone rany z martwych tkanek i wydzieliny, przez co wpływa korzystnie na proces gojenia. Odkazanie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowych gazików nasączonych nie rozcieńczonym preparatem Octenisept, promieniście od środka na zewnątrz rany.

Płukanie zakażonych ran chirurgicznych

Przemywanie zakażonych ran, przetok podskórnych nie penetrujących do jam ciała należy wykonywać za pomocą strzykawki i kaniuli. Pozostawienie gazików, setonów nasączonych preparatem Octenisept w obrębie zakażonej rany sprzyja oddzielaniu się martwych tkanek i pozwala na szybsze zagojenie się rany poprzez założenie wtórnych szwów.

Opracowywanie zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych podudzi, owrzodzeń troficzných w przebiegu chorób układowych (cukrzycy, miażdżycy itp.)

W przypadkach zakażonych ran oparzeniowych, owrzodzeniach żylnych itp. Octenisept stosujemy w postaci przymoczek (gaziki nasączone preparatem). Gaziki należy zmieniać raz, a w przypadku bardzo dużej ilości martwych tkanek i wydzieliny dwa razy na dobę umocowując opatrunek za pomocą siatki gazowej lub bandażu dzianych.

Płukanie ropni skóry, tkanki podskórnej, ropni okołoodbytniczych, zakażonych krwiociągów itp.

Po chirurgicznym opracowaniu nacięcia należy wypłukać jamę ropnia z wydzieliny za pomocą strzykawki z kaniulą używając nie rozcieńczonego preparatu Octenisept, aż do wypływu klarownego preparatu.

Dezynfekcja skóry i błony śluzowej

Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym preparatem. Należy przestrzegać wymaganego

czasu oddziaływania minimum 1 minuta, wskazane przedłużenie czasu do 5 minut. W sporadycznych przypadkach, po podjęciu takiej decyzji przez lekarza, można użyć Octenisept z atomizera rozpylając go bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy zwrócić uwagę na równomierne zwilżenie całej powierzchni. Pozostawić na co najmniej 1 minutę.

Irygacje

Octenisept może być z powodzeniem stosowany do irygacji pochwy. Wymagany czas oddziaływania 60 sekund. Skuteczność osiągana jest często przy rozcieńczeniu 1:1 z wodą jałową. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że Octenisept posiada doskonale działanie bójcze przeciwko różnym bakteriom m.in. Gram dodatnim i Gram ujemnym.

Dezynfekcja jamy ustnej

Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml preparatu Octenisept przez 20 sekund.

Skutki uboczne

Przy płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 godzinę - związek z oddziaływaniem preparatu.

Wskazówki

- przestrzegać kolejności działań higienicznych i pielęgnacyjnych
- Octenisept stosować tylko z oryginalnych opakowań
- nie mieszać z innymi preparatami
- przed zastosowaniem preparatu Octenisept zaleca się umycie obszaru błony śluzowej, która ma być poddana dezynfekcji
- należy przestrzegać całkowitego zwilżenia powierzchni antyseptykiem
- czas oddziaływania preparatu musi być przestrzegany i nie może być skrócony mimo jego wcześniejszego wyschnięcia
- opatrunki i folie operacyjne mogą być nałożone dopiero po dokładnym wyschnięciu preparatu
- Octenisept nie ma negatywnego wpływu na gojenie się ran

Dane fizyko-chemiczne

Wygląd: bezbarwny płyn
Punkt zapłonu: 99°C
Wartość pH: 6,0

Skuteczność mikrobiologiczna

Mikrobiologiczna skuteczność preparatu Octenisept została szeroko udokumentowana zarówno w badaniach laboratoryjnych jak i klinicznych. Skuteczność preparatu Octenisept w sensie niszczenia mikroorganizmów lub inaktywowania wirusów występuje już po 1 minutowym czasie reakcji. Przy obciążeniu białkiem jak ma to miejsce na powierzchni błony śluzowej w próbie laboratoryjnej Octenisept działa niszcząco na bakterie (łącznie z Chlamydia i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (Herpes simplex, inaktywuje HBV i HIV). Działanie preparatu utrzymuje się w czasie 1 godziny i tym samym zapewnia bezpieczeństwo przy wykonywaniu zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych. Dichloro-wodorek octenidyny należy do związków kationowo-czynnych, posiada dwa aktywne centra, działa na powierzchni rany i skóry.



Octenisept®



Schülke & Mayr

Alkohol fenoksyetylowy uzupełnia spektrum działania dichlorowodoru octenidyny działając w głębszych warstwach skóry i błon śluzowych.

Toksykologia

Tolerancja preparatu Octenisept została udowodniona przy pomocy klinicznych testów i doświadczeń na zwierzętach. Wyniki wykazują, że preparat:

- nie powoduje uczuleń
- nie posiada negatywnego oddziaływania na pierwotne gojenie się ran
- ostra doustna toksyczność dla szczurów - LD50 = 15ml/kg = relatywnie nieszkodliwy
- ostra toksyczność dla szczurów po zastosowaniu wewnątrztrzewnowym 11,9 ml/kg dla samców i 9,9 ml/kg dla samic.

Dichlorowodorek octenidyny zbadano pod kątem przewlekłej toksyczności, toksykologii produkcyjnej, potencjalnych możliwości powstania guzów, potencjału mutagennego, miejscowej toksyczności i farmakokinetyki nie uzyskując negatywnej oceny odnośnie stosowania preparatu. Nie otrzymano żadnych dowodów o szkodliwości dla embrionów lub teratogennym działaniu substancji aktywnych preparatu Octenisept. W przypadku ciąży nie należy spodziewać się efektów toksycznych w stosunku do embrionu - dziecka w związku z zastosowaniem preparatu Octenisept u matki. Dichlorowodorek octenidyny nie jest wchłaniany z preparatu Octenisept ani przez błonę śluzową pochwy (test na królikach) ani przez rany (test na ludziach).

Wielkość opakowań

50 ml butelka

250 ml butelka

450 ml butelka

1 L butelka

Butelki wykonane są z polietylenu (HDPE), za wyjątkiem nakrętek do butelek 1 L wykonanych z polipropylenu (PP).

Wypożyczenie uzupełniające:

aplikator waginalny

atomizer do butelki 250 ml

atomizer do butelki 1 L

pompka do butelki 450 ml i 1 L

Uwaga:

Nie zaleca się stosowania preparatu Octenisept do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do połykania preparatu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Trwałość koncentratu

(okres gwarancji / termin ważności): 5 lat

Preparat posiada pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka. Świad Rej. MZiOŚ Nr 10328/M/94

Dystrybutor:

Wytwórca:

S&M Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Strasse 2
22840 Norderstedt
Niemcy

Wyłączny przedstawiciel:



HIGIENA Sp. z o.o.

ul. Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa
tel./fax: 0-22/ 659-81-71
www.higiena.org.pl
e-mail: higiena@poczta.wp.pl