

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

VAGICAL
Globulki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Vagical i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagical
3. Jak stosować lek Vagical
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Vagical
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Vagical i w jakim celu się go stosuje

Vagical jest lekiem homeopatycznym wskazanym w stanach zapalnych dróg rodnych objawiających się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagical

Kiedy nie stosować leku Vagical

W nadwrażliwości (uczuleniu) na którykolwiek ze składników leku. W nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych *Asteraceae* (wcześniej złożonych *Compositae*) np. rumianek, jeżówka, arnika.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dziewczynek poniżej 12 roku życia. Stosowanie u osób w wieku 12-18 lat po konsultacji z lekarzem.

Lek Vagical a inne leki

Lek Vagical może być stosowany z innymi lekami.

Ulotka dla pacjenta

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować lek Vagical

Lek przeznaczony jest do podawania dopochwowego. Dorosłe kobiety: 1 globulka 2-3 razy dziennie. Przed zastosowaniem globulkę należy zwilżyć przegotowaną, ostudzoną wodą. Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej pochwy i sromu.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych [aktualny adres, nr telefonu i faksu, adres e-mail].

5. Jak przechowywać lek Vagical

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Vagical

Substancją czynną leku jest nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis TM*) 150 mg/globulkę.

Substancja pomocnicza to glikol polioksyetylenowy.

Jak wygląda lek Vagical i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 10 globulek w folii PVC/PE, w pudełku tekturowym z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30- 721 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014 -07- 1 0