

Przewodzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Ze względu na zawartość etanolu (22% v/v), preparat zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach Urarthone:

Lek zawiera etanol. 1 maksymalna dawka zawiera do 2850 mg etanolu, co jest równoważne 72,0 ml piwa lub 30,0 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u osób z nietolerancją niektórych cukrów.

3 - JAK STOSOWAĆ URARTHONE

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat stosowania leku:

Dorośli: doustnie, 2 - 3 razy dziennie po 1 łyżce stołowej.

Odpowiednią ilość płynu rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody.

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 1/2 godziny przed lub 1 godzinę po posiłku.

Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia. Maksymalny czas stosowania leku to 3 tygodnie.

W przypadku wrażenia, że lek nie działa lub działa za słabo, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Urarthone niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Urarthone:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4 - MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Do dnia sporządzenia ulotki nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

W przypadku jednak zaobserwowania objawów niepożądanych, należy powiadomić o nich lekarza.

5 - PRZECHOWYWANIE LEKU URARTHONE

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku Urarthone po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6 - INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

RUSTIKA Sp. z o.o.

ul. Wilcza 69

00-679 Warszawa

tel. 022 621 19 74

data opracowania ulotki: 2010-06



LEHNING
LABORATOIRES

623 074-03-PL

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Urarthone ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują należy skontaktować się z lekarzem.

Urarthone

płyn doustny

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Skład - 250 ml płynu zawiera:

Substancje czynne:

ColchicumD8 1,25 ml,
DulcamaraD8 2 ml,
Kalium iodatumD8 1,25 ml,
Aqua silicataD4 12,5 ml,
SulfurD4 5 ml,
Natrium salicylicumD8 12,5 ml,
Mercurius corrosivusD10 1,25 ml,
Bryonia albaD8 1,25 ml,
Viscum albumD3 3,75 ml,
Aurum muriaticum		
natronatumD8 0,62 ml,
Betula albaTM 5 ml.

Lek zawiera 22% v/v etanolu.

Zawartość leku w opakowaniu - 250 ml.

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratoires Lehning

3 rue du Petit Marais

57640 Sainte-Barbe - Francja

Spis treści ulotki:

- 1 - Co to jest lek Urarthone i w jakim celu się go stosuje
- 2 - Zanim zastosuje się lek Urarthone
- 3 - Jak stosować lek Urarthone
- 4 - Możliwe działania niepożądane
- 5 - Przechowywanie leku Urarthone
- 6 - Inne konieczne informacje dotyczące leku Urarthone

1 - CO TO JEST LEK URARTHONE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Urarthone jest lekiem homeopatycznym w postaci płynu doustnego stosowanym jako uzupełnienie leczenia w bólach reumatycznych i dnie moczanowej.

2 - ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK URARTHONE

Nie należy stosować leku:

- jeśli stwierdzono nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku

- jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów wówczas należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku

- u pacjentów z chorobą alkoholową.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek:

- u osób z niewydolnością wątroby

- u osób z padaczką.

Ciąża:

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci:

Nie należy stosować leku u dzieci.

Stosowanie z innymi lekami:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty. Interakcje z innymi lekami są nieznane.