

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Enalapril Vitabalans, 5 mg, tabletki
Enalapril Vitabalans, 10 mg, tabletki
Enalapril Vitabalans, 20 mg, tabletki
Enalaprylu maleinian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-) Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
-) W razie jakiegokolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
-) Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
-) Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Enalapril Vitabalans i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enalapril Vitabalans
3. Jak stosować lek Enalapril Vitabalans
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Enalapril Vitabalans
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Enalapril Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

Preparat Enalapril Vitabalans należy do grupy leków zwanych inhibitorami ACE. Lek ten działa przez rozszerzanie naczyń krwionośnych, ułatwiając sercu tłoczenie krwi przez naczynia do wszystkich części ciała. Prowadzi to do obniżenia wysokiego ciśnienia krwi.

Preparat Enalapril Vitabalans stosuje się:

- w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)
- w leczeniu objawowej niewydolności serca (stanu, w którym serce nie jest w stanie tłoczyć takiej ilości krwi, jaka jest konieczna do zaspokojenia potrzeb organizmu)
- w zapobieganiu objawowej niewydolności serca u pacjentów, u których upośledzona jest czynność serca ale nie ma jeszcze objawów choroby

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Enalapril Vitabalans

Kiedy nie stosować leku Enalapril Vitabalans

-) jeśli pacjent ma uczulenie na maleinian enalaprylu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
-) w przypadku wcześniejszych reakcji alergicznych wywołanych stosowaniem inhibitora ACE, zwanych obrzękiem naczynioruchowym, który polega na obrzęku skóry rąk, stóp, twarzy albo obrzęku warg, języka lub gardła co powoduje trudności w połykaniu lub oddychaniu
-) jeśli u pacjenta wystąpił wcześniej obrzęk naczynioruchowy z nieznanego powodu lub w przypadku wystąpienia obrzęku naczynioruchowego u bliskiego krewnego – skłonność do takiej reakcji może być rodzinna
-) jeśli pacjent przyjmuje lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiksza

si ryzyko obrz ku naczynioruchowego (szybkiego obrz ku tkanek znajduj cych si pod skór w miejscach takich, jak gardło).

- J po 3 miesi cu ci y (nale y równie unika stosowania leku Enalapril Vitabalans we wczesny okresie ci y – patrz punkt „Ci a”)
- J je li pacjent ma cukrzyc lub zaburzenia czynno ci nerek i jest leczony lekiem obni aj cym ci nienie krwi zawieraj cym aliskiren.

Ostrze enia i rodki ostro no ci

Przed rozpocz ciem stosowania Enalapril Vitabalans nale y omówi to z lekarzem lub farmaceut .

- J w przypadku przedłu aj cych si i obfitych biegunek i wymiotów
- J je li jednocze nie stosowane s leki zwi kszej ce wytwarzanie moczu, tzn. leki moczop dne
- J gdy pacjent stosuje diet małosoln
- J je li u pacjenta wyst puj inne choroby serca i naczy , takie jak choroba wie cowa (*dusznica bolesna*), zaburzenia kr enia mózgowego, wady zastawek serca, zw enie aorty lub choroba mi nia sercowego zwana kardiomiopati
- J w przypadku zaburze czynno ci nerek, wymagaj cych leczenia hemodializ lub w przypadku przebytego przeszczepu nerki
- J w przypadku zw enia t tnicy nerkowej powoduj cej nadci nienie t tnicze
- J je li wyst puj zaburzenia czynno ci w troby
- J w przypadku chorób tkanki ł cznej, które przebiegaj z zaj ciem naczy krwiono nych, jak choroba Raynauda lub twardzina układowa
- J w przypadku gdy stosowane w przeszło ci inhibitory ACE powodowały przedłu aj cy si , suchy kaszel (patrz punkt 4 „Mo liwe działania niepo dane”)
- J je li pacjent poddawany był odczulaniu, na przykład na jad pszczoł lub mrówek
- J w przypadku leczenia aferez LDL (sposób usuwania cholesterolu z krwi za pomoc specjalnego urz dzenia) cukrzycy (patrz punkt 2 „Stosowanie innych leków”)
- J u pacjentów z kolagenowym schorzeniem naczy , przyjmuj cych leki hamuj ce układ odporno ciowy (stosowane w terapii zaburze autoimmunologicznych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub po operacji przeszczepu), leczonych allopurynolem (stosowanym w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamidem (stosowanym w leczeniu zaburze rytmu serca). Lekarz mo e okresowo pobiera próbki krwi, aby sprawdzi liczb krwinek białych. Je eli u takich pacjentów wyst pi objawy zaka enia (np. podwy szona temperatura, gor czka), nale y niezwłocznie zawiadomi swojego lekarza
- J w przypadku stosowania preparatów potasu lub zamienników soli zawieraj cych potas
- J w przypadku stosowania litu, u ywanego w leczeniu niektórych schorze psychicznych
- J u osób rasy czarnej, poniewa działanie enalaprilu mo e by słabsze
- J je li pacjent przyjmuje którykolwiek z poni szych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ci nienia krwi:
 - antagonist receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane równie jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza je li pacjent ma zaburzenia czynno ci nerek zwi zane z cukrzyc .
 - aliskiren.

Lekarz prowadz cy mo e monitorowa czynno nerek, ci nienie krwi oraz st enie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odst pach czasu.

Patrz tak e informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosowa leku Enalapril Vitabalans”.

Je li pacjent przyjmuje którykolwiek z nast puj cych leków, ryzyko obrz ku naczynioruchowego mo e si zwi kszy :

- J racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki;
- J leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narz du oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus);
- J wildagliptyna, lek stosowany w leczeniu cukrzycy.

Podczas stosowania leku Enalapril Vitabalans, należy niezwłocznie powiadomić lekarza o ile wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

-)] zawroty głowy po zastosowaniu pierwszej dawki. Niektóre osoby reagują na podanie pierwszej dawki lub na zwiększenie dawki zawrotami głowy, osłabieniem, omdleniem i/lub wymiotami
-)] nagły obrzęk warg i twarzy, języka, gardła, szyi, niekiedy również obrzęk rąk i stóp, albo wyszczepiony oddech lub chrypka. Stan ten nosi nazwę obrzęku naczynioruchowego. Może on wystąpić w każdym momencie leczenia. Inhibitory ACE częściej wywołują obrzęk naczynioruchowy u osób rasy czarnej niż u pozostałych ras
-)] wysoka temperatura, ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej (mogą to być objawy infekcji spowodowanej obniżeniem liczby krwinek białych)
-)] zaczerwienienie skóry i twardówki oczu (łójaczka), które mogą być objawami choroby w tętnicy.

Jeżeli którykolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, powinien on skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia preparatem Enalapril Vitabalans – tabletki.

W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub operacji w znieczuleniu ogólnym lub rdzeniowym, należy poinformować anesteziologa o stosowaniu leku Enalapril Vitabalans.

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Enalapril Vitabalans we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

Lek Enalapril Vitabalans a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności, lekarz powinien zostać poinformowany o stosowaniu następujących leków:

-)] leki moczopędne (diuretyki)
-)] suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom)
-)] inne leki stosowane w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi
-)] inne leki, które mogą obniżać ciśnienie krwi, takie jak nitraty stosowane w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, trójpierścieniowe leki antydepresyjne, leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych (fenotiazyny) lub barbiturany stosowane w leczeniu padaczki, leki narkotyczne i rodki znieczulające
-)] lit (stosowany w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych)
-)] leki przeciwcukrzycowe (zarówno preparaty insuliny jak i doustne leki przeciwcukrzycowe) – dawkowanie tych leków może wymagać zmiany
-)] allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)
-)] leki hamujące układ odpornościowy, stosowane np. po przeszczepie narządu
-)] działające przeciwbólowo niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub ketoprofen stosowane regularnie lub przewlekłe – Uwaga: W trakcie przyjmowania preparatu Enalapril Vitabalans – tabletki można bezpiecznie stosować niewielkie dawki kwasu acetylosalicylowego (na przykład 50 mg lub 100 mg na dobę) w celu zapobiegania zakrzepom.
-)] leki sympatykomimetyczne
-)] jednoczesne leczenie preparatami złota może powodować zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i obniżenie ciśnienia krwi

Lekarz prowadzący może być zobowiązany do zmiany dawki i (lub) zastosowania innych leków ostrożnie:
Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Enalapril Vitabalans” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Enalapril Vitabalans z jedzeniem i piciem

Posiłki i napoje nie wpływają na absorpcję enalaprilu. Tabletki mogą być przyjmowane na czczo lub z posiłkiem z wystarczającą ilością płynu, na przykład ze szklanką wody.

Spożywanie dużej ilości soli (chlorku sodu) może osłabić działanie leku Enalapril Vitabalans.

Spożywanie pokarmów zawierających duży ilość potasu i zamienników soli w trakcie stosowania leku Enalapril Vitabalans nie jest zalecane, ponieważ stwierdzenie potasu we krwi może ulec nadmiernemu wzrostowi.

Alkohol może nasilać działanie leku Enalapril Vitabalans na ciśnienie krwi.

Ciąża i karmienie piersi

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza się, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Enalapril Vitabalans przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Enalapril Vitabalans. Nie zaleca się stosowania leku Enalapril Vitabalans we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersi

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się karmienia piersi noworodków (pierwsze kilka tygodni po urodzeniu), a zwłaszcza wcześniaków, podczas stosowania leku Enalapril Vitabalans.

W przypadku starszych niemowląt lekarz poinformuje o korzyściach i ryzyku stosowania leku Enalapril Vitabalans podczas karmienia piersią, w porównaniu do innych sposobów leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn należy wziąć pod uwagę, że niekiedy mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie.

Lek Enalapril Vitabalans może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane związane z obniżeniem ciśnienia krwi, takie jak zawroty głowy, omdlenia lub zaburzenia ostrości widzenia (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Pojawiają się one zazwyczaj na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki; ich wystąpienie jest mało prawdopodobne podczas długotrwałego leczenia. W przypadku pojawienia się takich objawów, należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz wykonywania innych prac wymagających koncentracji.

3. Jak stosować lek Enalapril Vitabalans

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Enalapril Vitabalans może być przyjmowany w trakcie posiłków lub pomiędzy nimi, z wystarczającą ilością płynu, na przykład ze szklanką wody.

Doro li:

Leczenie podwy szonego ci nienia krwi:

Dawka pocz tkowa wynosi zazwyczaj od 5 mg do 20 mg raz na dob a dawka podtrzymuj ca 20 mg raz na dob .

Leczenie niewydolno ci serca:

Dawka pocz tkowa wynosi 2,5 mg na dob . Dawk nale y stopniowo zwi ksza do chwili osi gni cia dawki podtrzymuj cej. Dawka ta wynosi zazwyczaj 20 mg na dob , podawana w jednej dawce lub w dwóch dawkach podzielonych.

Osoby starsze i osoby z niewydolno ci nerek:

Dawk nale y dostosowa do stopnia wydolno ci nerek pacjenta.

Stosowanie u dzieci

Wła ciw dawki ustala si na podstawie ci aru ciała dziecka.

Je eli pacjent uzna, e działanie leku Enalapril Vitabalans jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien poinformowa o tym lekarza.

Zastosowanie wi kszej ni zalecana dawki leku Enalapril Vitabalans

W przypadku za ycia zbyt du ej dawki leku, nale y niezwłocznie skontaktowa si z lekarzem, oddziałem pomocy dora nej lub z najbli szym szpitalem. Do najcz ciej wyst puj cych oznak i objawów przedawkowania nale : obni enie ci nienia krwi oraz zamroczenie (stan prawie całkowitej utraty przytomno ci). Inne objawy to zawroty głowy lub oszołomienie spowodowane obni eniem ci nienia krwi, mocne bicie serca, przyspieszona akcja serca, niepokój, kaszel, niewydolno nerek i przyspieszony oddech.

Pomini cie zastosowania leku Enalapril Vitabalans

Nie nale y przyjmowa podwójnej (lub zwi kszonej) dawki w celu uzupełnienia pomini tych dawek. Nale y za y nast pn tabletk o normalnej porze.

Przerwanie stosowania leku Enalapril Vitabalans

W przypadku przerwania stosowania leku, ci nienie krwi mo e wzrosn . Gdy ci nienie krwi jest zbyt wysokie, mo e ono wpłyn na czynno serca i nerek. Nie nale y przerywa stosowania leku, o ile lekarz tego nie zaleci.

W razie jakichkolwiek dalszych w tpliwo ci zwi zanych ze stosowaniem tego leku nale y zwróci si do lekarza lub farmaceuty.

4. Mo liwe działania niepo dane

Jak ka dy lek, lek ten mo e powodowa działania niepo dane, chocia nie u ka dego one wyst pi .

Bardzo cz sto (pojawiaj ce si cz ciej ni u 1 na 10 pacjentów):

-) zaburzenia ostro ci widzenia
-) zawroty głowy, osłabienie
-) suchy kaszel (nale y skontaktowa si z lekarzem, je eli w trakcie leczenia preparatem Enalapril Vitabalans pojawi si uporczywy kaszel)
-) nudno ci

Cz sto (pojawiaj ce si u 1 do 10 osób na 100 pacjentów):

-) bóle głowy, depresja, zm czenie

- J nadmierne obniżenie ciśnienia krwi lub obniżenie ciśnienia krwi w trakcie przyjmowania pozycji stojącej (co jest przyczyną zawrotów głowy lub omdleń)
- J ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca (tachykardia)
- J duszno
- J biegunka, bóle brzucha, zaburzenia odczuwania smaku
- J wysypka i inne objawy wynikające z nadwrażliwości (patrz poniżej „Obrzęk naczynioruchowy”)
- J podwyższenie stężenia potasu i kreatyniny w surowicy

Niezbyt często (pojawiają się u 1 do 10 osób na 1 000 pacjentów):

- J niedokrwistość
- J nadmierne obniżenie stężenia cukru (hipoglikemia) u pacjentów z cukrzycą
- J oszołomienie, nerwowość, zaburzenia czucia, takie jak: uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), zawroty głowy, senność, bezsenność
- J uczucie silnego bicia serca (kołatanie serca)
- J nieżyt nosa, ból gardła, chrypka, niedrożność dróg oddechowych
- J uczucie dzwonienia w uszach
- J suchota jamy ustnej, wymioty, zgaga, podrażnienie błony śluzowej, zaparcia, spadek ciśnienia ciała
- J wrzód błony śluzowej lub dwunastnicy, niedrożność jelit, zapalenie trzustki (mogą być przyczyną bólu brzucha)
- J nadmierne pocenie, wzdęcie, pokrzywka, łysienie, zaczerwienienie
- J upośledzenie czynności nerek, obecność białka w moczu
- J impotencja
- J kurcze mięśni, ogólne złe samopoczucie, gorączka (patrz poniżej „Gorączka o niejasnym pochodzeniu”)

Rzadko (pojawiają się u 1 do 10 osób na 10 000 pacjentów):

- J obniżenie liczby krwinek białych (patrz poniżej „Gorączka o niejasnym pochodzeniu”)
- J obniżenie liczby płytek (może powodować krwawienie z nosa i tendencje do powstawania siniaków)
- J powiększenie węzłów chłonnych, rozwój choroby autoimmunologicznej
- J koszmary sennego, zaburzenia snu
- J zaostrzenie zespołu Raynauda (ból palców rąk i stóp, które na początku stają się białe, potem niebieskie, a na końcu czerwone)
- J nacieki w płucach, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilowe zapalenie płuc
- J zapalenie jamy ustnej, owrzodzenia aftowe w jamie ustnej, zapalenie języka
- J upośledzenie czynności wątroby, zapalenie wątroby, niedrożność dróg żółciowych z żółtaczką (żółty kolor skóry i zażółcenie białkówki oczu)
- J ciężkie pęcherzowe lub złuszczeniowe zmiany skóry lub błon śluzowych (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozplywna naskórki, pęcherzyca, rumień)
- J zespół obejmujący gorączkę, zapalenie mięśni lub naczyń krwionośnych, bóle mięśni i stawów (patrz poniżej „Gorączka o niejasnym pochodzeniu”)
- J zmniejszenie ilości moczu
- J powiększenie gruczołów piersiowych (u mężczyzn)
- J podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych, podwyższenie stężenia bilirubiny w surowicy

Bardzo rzadko (występuje u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- J obrzęk ścian jelita (obrzęk naczynioruchowy jelit)

Często nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- J zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego

Obrzęk naczynioruchowy

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli w trakcie leczenia preparatem Enalapril Vitabalans wystąpią takie objawy, jak obrzęk rąk, stóp, twarzy albo obrzęk języka lub gardła, co może doprowadzić do trudności z połykaniem lub oddychaniem.

Gorączka o niejasnym pochodzeniu

Należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem, jeżeli w trakcie leczenia preparatem Enalapril Vitabalans wystąpi gorączka o niejasnym pochodzeniu z towarzyszącymi objawami grypopodobnymi takimi, jak ból gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Działania Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dziękujemy za zgłaszanie działań niepożądanych, które może przyczynić się do zgromadzenia dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Enalapril Vitabalans

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Enalapril Vitabalans

Substancją czynną jest enalaprylu maleinianu. Każda tabletki zawiera 5 mg, 10 mg lub 20 mg enalaprylu maleinianu.

Pozostałe składniki: Skrobia łobowa, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, powidon K-29/32, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, talk.

Preparat Enalapril Vitabalans, 10 mg, tabletki zawiera również składnik kolorujący cyjanin (elazę tlenek czerwony, E172).

Preparat Enalapril Vitabalans, 20 mg, tabletki zawiera również składnik kolorujący cyjanin (elazę tlenek czerwony i elazę tlenek żółty, E172).

Jak wygląda lek Enalapril Vitabalans i co zawiera opakowanie

Jak wygląda lek Enalapril Vitabalans

Preparat Enalapril Vitabalans, 5 mg: Tabletki są białe, okrągłe, płaskie, posiadają nacięcie z jednej strony tabletki. Grubość wynosi 8 mm.

Preparat Enalapril Vitabalans, 10 mg: Tabletki są czerwono-brązowe, okrągłe, płaskie, posiadają nacięcie z jednej strony tabletki. Grubość wynosi 8 mm.

Preparat Enalapril Vitabalans, 20 mg: Tabletki są jasnopomarańczowe, okrągłe, płaskie, posiadają nacięcie z jednej strony tabletki. Grubość wynosi 8 mm.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Rozmiar opakowania :

28, 30, 56, 60, 98, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy
Varastokatu 8
13500 Hämeenlinna
FINLANDIA
Tel: +358 (3) 615600
Telefaks: +358 (3) 6183130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami

Enalapril Vitabalans (FI, SE, PL, CZ, SK, SI, DE, DK, EE, LV, LT, HU)

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 28.03.2019