





Pharmazeutischer Unternehmer:
Unimark Remedies s.r.o.,
Prag 2, Vinohrady, Bělehradská 568/92,
PSC 120 00, Tschechische Republik

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Montelukastum Unimark, 10 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Dla młodzieży w wieku od 15 lat oraz dla dorosłych

Montelukastum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

- Co to jest Montelukastum Unimark i w jakim celu się go stosuje
- Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukastum Unimark
- Jak stosować Montelukastum Unimark
- Możliwe działania niepożądane
- Jak przechowywać Montelukastum Unimark
- Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Montelukastum Unimark i w jakim celu się go stosuje

Pełna nazwa leku to Montelukastum Unimark, 10 mg, tabletki powlekane.

Lek Montelukastum Unimark 10 mg tabletki powlekane zawiera jako substancję czynną montelukast.

Montelukast to antagonistą receptora leukotrienowego blokujący działanie substancji zwanych leukotrienami. Leukotrieny wywołują zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach i wywołują objawy alergii. Poprzez blokowanie działania leukotrienów montelukast łagodzi objawy astmy i ułatwia kontrolę jej objawów, a także łagodzi objawy alergii sezonowej (zwanej też katarą sienną, gorączką sienną lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa).
Lekarz zapisał pacjentowi Montelukastum Unimark w celu leczenia występującej u niego astmy, aby zapobiegać występowaniu objawów tej choroby w ciągu dnia i w nocy. Lek ten jest przeznaczony dla pacjentów powyżej 15 roku życia.

- Montelukast jest stosowany w leczeniu pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą stosowanych dotychczas leków i w związku z tym wymagają oni zastosowania dodatkowego leczenia.
- Montelukast zapobiega też zwężeniu dróg oddechowych wywołowanemu przez wysiłek fizyczny.
- U pacjentów chorych na astmę, u których stosowanie montelukastu jest wskazane z powodu astmy, lek ten może też łagodzić objawy sezonowe go alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Lekarz określi, jak należy stosować Montelukastum Unimark w zależności od występujących u pacjenta objawów i stopnia nasilenia astmy.

Co to jest astma?
Asta to choroba przewlekła.

W przebiegu astmy stwierdza się następujące zaburzenia:

- Utrudnione oddychanie spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Stopień zwężenia dróg oddechowych zwiększa się lub zmniejsza pod wpływem różnych czynników.
- Nadwrażliwość dróg oddechowych, które reagują na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrze lub wysiłek fizyczny.
- Obrzęk (stan zapalny) błony śluzowej wyściełającej drogi oddechowe.

Objawy astmy obejmują: kaszel, świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej.

Co to jest alergia sezonowa?
Alergia sezonowa (zwana też katarą sienną, gorączką sienną lub sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) to odpowiedź alergiczna organizmu na unoszące się w powietrzu pyłki drzew, traw i chwastów. W typowych przypadkach objawy alergii sezonowej obejmują: zatłkany nos, katar, swędzenie nosa, kichanie, nadmierne łzawienie, obrzęk powiek, zaczerwienienie i swędzenie oczu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Montelukastum

Unimark
Kiedy nie stosować leku Montelukastum Unimark
Jeśli pacjent ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukastum Unimark należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- W przypadku nasilenia się objawów astmy lub wystąpienia duszności należy natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Przyjmowany doustnie Montelukastum Unimark nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu napadów astmy. W przypadku wystąpienia napadu astmy należy zastosować się do poleceń otrzymanych od lekarza. Należy zawsze mieć przy sobie wziewny lek do stosowania doraźnego w przypadku wystąpienia napadu astmy.
- Bardzo ważne, aby przyjmować wszystkie leki na astmę zapisane przez lekarza. Leku Montelukastum Unimark nie należy stosować zamiast innych leków na astmę.
- Należy skonsultować się z lekarzem jeśli u pacjenta otrzymującego leki na astmę wystąpią jednocześnie takie objawy jak: objawy przypominające grypę, drętwienie lub mrowienie w kończynach górnych lub dolnych, nasilenie objawów ze strony dróg oddechowych (lub) wysypka.
- Pacjenci, u których objawy astmy nasilają się pod wpływem kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub leków przeciwzapalnych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), nie powinny przyjmować tych leków.

Dzieci i młodzież
Dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat Montelukastum Unimark dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 4 mg.
Dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat Montelukastum Unimark dostępny jest w postaci tabletek do rozgryzania i żucia o mocy 5 mg.

Inne leki i Montelukastum Unimark
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planuje się zastosować.
Niektóre leki wpływać na działanie leku Montelukastum Unimark. Również lek Montelukastum Unimark może wpływać na działanie innych leków.

Jest szczególnie ważne, aby przed rozpoczęciem stosowania leku Montelukastum Unimark poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

- fenobarbital (lek stosowany w leczeniu padaczki),
- fenytoinę (lek stosowany w leczeniu padaczki),
- ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń),
- gemfibrozyl (lek stosowany w leczeniu podwyższonego poziomu tłuszczów w osoczu).

Montelukastum Unimark a jedzenie
Lek Montelukastum Unimark 10 mg tabletki powlekane można przyjmować niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza. Lekarz ustali, czy pacjentka może przyjmować montelukast w tym okresie.

Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego. Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza zacząć karmić piersią, powinna o tym powiedzieć lekarzowi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Montelukast nie powinien wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Niemniej, każda osoba może w inny sposób reagować na ten lek. Niektóre działania niepożądane (np. zawroty głowy i senność), które bardzo rzadko obserwowano podczas stosowania montelukastu, mogą wpływać na zdolność niektórych pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Montelukastum Unimark zawiera laktozę
Jeśli lekarz stwierdził u pacjenta nietolerancję pewnych cukrów, np. laktozy, wówczas pacjent przed przyjęciem omawianego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Montelukastum Unimark

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Należy przyjmować jedną tabletkę leku Montelukastum Unimark na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Lek należy stosować nawet wówczas, gdy u pacjenta nie występują żadne objawy lub jeśli u pacjenta występuje napad astmy.
- Lek należy przyjmować doustnie. Tabletkę należy połknąć, popijając

Size : W-230mm x H-350mm



