


PT Fórmula em pó nutricionalmente completa à base de aminoácidos livres. Hiperalérgico. Para a gestão nutricional de crianças com: Alergia ao leite de vaca, intolerância proteica múltipla. Outras indicações, em que seja recomendada uma dieta elementar. **Alimento para fins medicinais específicos.**

Importante: Exclusivamente para uso entérico – não adequado para utilização por via parentérica. Deve ser consumido sob supervisão médica. Não adequado para crianças com idade inferior a 1 ano. Adequado como fonte alimentar única ou como suplemento da dieta.

Quantidade recomendada: A quantidade da fórmula e a sua diluição devem ser determinadas unicamente pelo médico ou nutricionista, e depende da idade, peso corporal e condição clínica individual.

Concentração recomendada: A concentração recomendada da diluição é de 21.1% w/v (1kcal/ml) – para atingir esta concentração adicionar 1 colher de medida de pó para cada 30 ml de água. Cada colher de medida corresponde a 7.3 g de pó



Modo de preparação: Lave as mãos e utilize utensílios limpos. Meça a quantidade recomendada de água num recipiente. Adicione a quantidade de pó recomendada à água. Utilize apenas a colher de medida fornecida na embalagem. Feche o recipiente e agite até que o pó se dissolva. Após a reconstituição, refrigere e consuma no período máximo de 24 horas. Mexa ou agite imediatamente antes de utilizar. Para administração oral, é melhor servir fresco. Nota: Não ferver após a preparação. Não utilizar o micro-ondas para preparar ou aquecer a fórmula. **Conservação:** Conservar num local seco e fresco. Fechar sempre a tampa da embalagem depois de utilizar. Após a abertura, consumir no prazo de um mês. Embalado em atmosfera protetora.

Ingredientes: xarope de glicose desidratado, óleos vegetais refinados (triglicéridos de cadeia média (óleo de semente de palma e/ou óleo de coco), óleo de grão-de-bico rico em ácido oleico, óleo de canola, óleo de girassol), L-serina, L-glutamina, maltodextrina, glicina, L-alanina, L-leucina, acetato de L-isina, L-treonina, citrato tripotássico, L-tirosina, emulsionante (E472c), L-valina, L-isoleucina, fosfato de cálcio dibásico, cloreto de magnésio, L-prolina, hidrogenofostato dissódico, carbonato de cálcio, cistina, L-histidina, L-fenilalanina, hidrogenofostato dipotássico, L-metionina, L-arginina, cloreto de sódio, bitartrato de colina, L-triptofano, citrato tricálcico, ácido L-ascórbico, cloreto de cálcio, antioxidantes (lecitina de girassol, palmato de ascorbilo), taurina, inositol, sulfato ferroso, L-carnitina, sulfato de zinco, acetato de DL- α -tocofenilo, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato cúprico, riboflavina, sulfato de manganés, cloridrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, acetato de retinilo, iodeto de potássio, ácido pterilmonoglutâmico, molibdato de sódio, cloreto de cromo, selênio de sódio, filloquinona, D-biotina, colezcaliferol, cianocobalamina.

Lote nº/Consumir de preferência antes de: ver fundo da lata 400 g e.

400 g e

PL Neocate Junior o smaku neutralnym. Produkt w postaci proszku, oparty na aminokwasach, kompletny pod względem odżywczym, hipoałergiczny. Do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w: alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. **Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego.**

Ważne informacje: Ostrzeżenie: Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Stosować pod nadzorem lekarza. Nie stosować u niemowląt poniżej 1. roku życia. Produkt odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia lub jako uzupełnienie diety.

Proponowane dawkowanie: Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Zalecane stężenie 21,1% w/v (1kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

Colheres de medida Ilość miarek	Água (ml) Woda (ml)	Volume total aproximado (ml) Objętość całkowita w przybliżeniu (ml)
1 (7,3 g)	30	35
3 (21,9 g)	90	105
10 (73 g)	300	350

Przygotowanie: Umyć ręce. Używać czystych naczyń. Odmierzyć wymaganą objętość wody i wlać do naczynia. Napełnić proszkiem miarkę załączoną do opakowania. Nadmiar proszku usunąć czystym, suchym nożem. Nie ubijać proszku w miarce. Używać wyłącznie miarki załączoną do opakowania. Dodać zalecaną ilość miarek proszku do wody. Zamknąć naczynie i wstrząsać, aż proszek się rozpuści. Produkt przygotowany do spożycia przechowywać w lodówce i spożyć w ciągu 24 godzin. Wstrząsać lub zamieszać bezpośrednio przed podaniem. Produkt stosowany doustnie najlepiej podawać schłodzony.

Ważne: Nie gotować przygotowanego posiłku. Nie używać kuchenki mikrofalowej do przygotowania lub podgrzania posiłku. Najlepiej spożyć przed: na dzień puszkii.

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Po każdorazowym użyciu dokładnie zamknąć puszkę wieczkiem. Zużyć proszek w ciągu jednego miesiąca od pierwszego otwarcia puszkii. Produkt pakowany w atmosferze ochronnej. **Składniki:** suchy syrop glukozowy, rafinowane oleje roślinne (średnicianouchowe triglicydy (olej ziaren palmowych i/ub olej kokosowy), olej słonecznikowy o wysokiej zawartości kwasu oleinowego, olej rzepakowy, olej słonecznikowy), L-seryna, L-glutamina, maltodekstryna, glicyna, L-alanina, L-leucyna, octan L-izyny, L-treonina, cytrynian potasu, L-tryzyna, emulgator (mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych esteryfikowane kwasem cytrynowym), L-walina, L-izoleucyna, wodorofosforan wapnia, chlorek magnezu, L-prolina, wodorofosforan disodu, węgiel wapnia, L-cystyna, L-histydyna, L-fenylalanina, wodorofosforan dipotasu, L-metionina, L-arginina, chlorek sodu, diminylna cholina, L-triptofan, cytrynian wapnia, kwas L-askorbinowy, chlorek wapnia, przeciwdrożdżycze (lecytyna słonecznikowa, palmitynian L-askorbylu), tauryna, inozytol, siarczan żelaza(II), L-karnityna, siarczan cynku, octan DL-alfa-tokolicyny, nikotynamid, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi(II), ryboflawina, siarczan manganu, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, octan retinylu, jodek potasu, kwas pterilmonoglutaminowy, molibdenian(VI) sodu, chlorek chromu(III), selenian(IV) sodu, fitomenadion, D-biotyna, cholekalcyferol, cyjanokobalamina.

NUTRICIA Neocate Junior

1+



**Sabor Neutro
o smaku neutralnym
400 g e**

LVP003_Tin label_M_v01

Composição nutricional por/Wartość odżywcza

	100 g de pó/100 g proszku:	100 ml*	100 g de pó/100 g proszku:	100 ml*
Valor energético/ Wartość energetyczna	1992 kJ 475 kcal	420 kJ 100 kcal	Vit. B6/Wit. B6	0,48 mg 0,10 mg
Lípidos/Łuszczyz (42 En%) dos quais/w tym	22,0 g	4,6 g	Ácido fólico/Kwas foliowy	71,3 µg 15,0 µg
- Saturados/Kwasy nasycone	9,4 g	2,0 g	Vit. B12/Wit. B12	1,2 µg 0,25 µg
- Monoinsaturados/ Jednonasycone	7,7 g	1,6 g	Biotina/Biotyna	14,3 µg 3,0 µg
- Poliinsaturados/ Wielonasycone	4,0 g	0,84 g	Vit. C/Wit. C	47,5 mg 10,0 mg
Hidratos de carbono/ Węglowodany (47 En%) dos quais/w tym	56,0 g	11,8 g	Minerais e Oligoelementos/Składniki mineralne i pierwiastki śladowe	
- Açúcares/Cukry	5,0 g	1,1 g	Na	285 mg 60,1 mg
Fibra/Błonnik (0 En%)	0 g	0 g	K	546 mg 115 mg
Equivalentes proteico/ Równoważnik białka (11 En%)	13,3 g	2,8 g	Cl	437 mg 92,2 mg
Sal/Sól	0,71 g	0,15 g	Ca	428 mg 90,3 mg
Vitaminas/Witaminy			P	309 mg 65,2 mg
Vit. A/Wit. A	214 µg	45,2 µg	Mg	66,5 mg 14,0 mg
Vit. D/Wit. D	6,2 µg	1,3 µg	Fe	5,7 mg 1,2 mg
Vit. E/Wit. E	6,7 mg (α-TE/EI)	1,4 mg (α-TE/EI)	Zn	5,2 mg 1,1 mg
Vit. K/Wit. K	19,0 µg	4,0 µg	Cu	0,48 mg 0,10 mg
Tiamina	0,48 mg	0,10 mg	Mn	0,29 mg 0,06 mg
Riboflavina/Ryboflawina	0,95 mg	0,20 mg	Mo	21,4 µg 4,5 µg
Niacina/Niacyna (9,0 mg NE/EN)	5,3 mg (1,9 mg NE/EN)	1,1 mg	Se	15,2 µg 3,2 µg
Ácido pantoténico/ Kwas pantotenowy	1,9 mg	0,40 mg	Cr	7,6 µg 1,6 µg
			I	71,3 µg 15,0 µg
			Outros/Inne	
			Colina/Cholina	95,0 mg 20,0 mg
			Inositol/Inozitol	26,1 mg 5,5 mg
			L-carnitina/L-karnityna	15,80 mg 3,3 mg
			Taurina/Tauryna	31,45 mg 6,6 mg
			Osmolalidade/Osmolalność	600 mOsmol/kg H ₂ O

*A concentração recomendada de 21.1%/
*Zalecane stężenie wynosi 21,1%

Lote nº/Consumir de preferência antes de: ver fundo da lata
Produzido no Reino Unido por SHS International Ltd.
Distribuído em Portugal por: Nutricia Advanced Medical Nutrition – Unipessoal, Lda. Avenida D. João II nº41 3º Piso, Torre Zen, 1990-084 Lisboa Telef: 214 259 600 Linha Verde: 800 206 799 www.nutricia.pt
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii przez SHS International Ltd.
NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Serwis Konsumentcki:
tel.: 22 55 00 155,
e-mail: serwis@nutriciamedyczna.pl



10327166
129764



5 016533 616170