

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Węgiel leczniczy (Norit), 200 mg, kapsułki twarde

Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Węgiel leczniczy (Norit) i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Węgiel leczniczy (Norit)
3. Jak stosować Węgiel leczniczy (Norit)
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Węgiel leczniczy (Norit)
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Węgiel leczniczy (Norit) i w jakim celu się go stosuje

Węgiel leczniczy (Norit), wytwarzany jest z surowca roślinnego, wykazuje silne właściwości adsorpcyjne. W przewodzie pokarmowym wiąże drażniące i toksyczne substancje, uniemożliwiając ich wchłonięcie. Lek może być stosowany również u dzieci.

Wskazania do stosowania:

Nieżyty jelit, biegunka, wzdęcia, nadmierna fermentacja jelitowa, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu.

Jako lek uzupełniający w leczeniu zatruc substancjami toksycznymi, z wyjątkiem zatruc cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami - stosowany w porozumieniu z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Węgiel leczniczy (Norit)

Kiedy nie stosować leku Węgiel leczniczy (Norit)

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (część jelita grubego);
- u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku Węgiel leczniczy (Norit) z innymi lekami, gdyż może osłabiać ich działanie. Podczas leczenia stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie.

W przypadku trwania biegunki po 3 dniach leczenia należy przeprowadzić dodatkowe badania lekarskie laboratoryjne w celu określenia przyczyny choroby.

W leczeniu ostrych zatruc inne niezbędne leki należy podawać pozajelitowo. W przypadku konieczności wywołania wymiotów, należy wywołać je przed podaniem leku. Węgiel należy podać 30 do 60 minut po ustaniu wymiotów. Nie należy stosować węgla jeśli niezbędne jest doustne podanie innego specyficznego antidotum, np. metioniny.

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy). Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodnej i elektrolitowej, środki przeczyszczające należy podczas leczenia stosować ostrożnie i tylko sporadycznie.

Węgiel leczniczy (Norit) jest mało skuteczny w zatruciu m.in. kwasem borowym, siarczanem żelaza(II) i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, metanolem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej oraz kwasami i zasadami mineralnymi.

Pacjenci przyjmujący lek przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy, powinni skontaktować się z lekarzem. Jeśli u pacjentów leczonych z powodu biegunki wystąpi gorączka lub krew w stolcu, należy skontaktować się z lekarzem.

Węgiel leczniczy(Norit) a inne leki

Węgiel leczniczy może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego. Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Dotychczas nie są znane przeciwwskazania do stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Węgiel leczniczy (Norit)

Biegunka:

3 lub 4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielką ilością wody.

W razie konieczności dawkę można powtarzać 3 lub więcej razy na dobę. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.

Zatrucie:

Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych (jedną po drugiej, popijając niewielką ilością wody).

Dawkę należy powtarzać kilkakrotnie, po krótkich przerwach.

Natychmiast zawiadomić lekarza.

Zawiesinę węgla aktywnego można podawać przez zgłębnik żołądkowy, np. podczas płukania żołądka.

W przypadku zatrucia, jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, lek należy zażyć jak najszybciej. Im wcześniej się go zastosuje, tym lepszy jest wynik działania.

W czasie przyjmowania leku Węgiel leczniczy (Norit) stolce mogą mieć ciemne lub czarne zabarwienie. Stosowanie leku należy ograniczyć tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zaprzestać jego stosowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Węgiel leczniczy (Norit)

Po zażyciu dużych dawek może wystąpić niedrożność jelita cienkiego. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit (np. siarczanu sodu).

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaparcia. Można temu zapobiec poprzez podawanie leków pobudzających perystaltykę jelit. Ponadto lek może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe i wymioty, zwłaszcza u dzieci. Odnotowano także przypadki wciągnięcia leku do płuc. Węgiel leczniczy (Norit) barwi stolec na czarno.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309,

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Węgiel leczniczy (Norit)

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Węgiel leczniczy (Norit)

- Substancją czynną leku jest węgiel aktywny (*Carbo activatus*).
- Pozostałe składniki to: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Węgiel leczniczy (Norit) i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kapsułek twardych, opakowanych w blistry z folii Aluminium-PVC/PVDC i tekturowe pudełko.

Opakowanie zawiera 15 albo 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Norit Nederland B.V.

Astronaut 34

3824 MJ Amersfoort

Holandia

Wytwórca

Norit Nederland B.V.

Mr. Ovingkanaal-O.Z.3

7891 EV Klazienaveen

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 03/2022