

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

OLEJ RYCYNOWY, 1 g/g, płyn doustny *Oleum Ricini*

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4
- Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Olej rycynowy i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olej rycynowy
3. Jak stosować lek Olej rycynowy
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Olej rycynowy
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Olej rycynowy i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Tradycyjnie jako środek przeczyszczający w zaparciach.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Olej rycynowy

Kiedy nie stosować leku Olej rycynowy:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na olej rycynowy
- w chorobach zapalnych przewodu pokarmowego
- u osób z niedrożnością jelit, z stanami zapalnymi narządów jamy brzusznej, w tym z zapaleniem wyrostka robaczkowego, z bólami brzucha o niejasnej etiologii.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Oleju rycynowego należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Wypróżnienie następuje po około 2-3 godzinach od podania produktu. Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku.

Lek stosować doraźnie, produktu nie należy stosować przez dłuższy czas (kilka dni). W przypadku nie ustąpienia objawów zaparcia lub wystąpienia działań niepożądanych skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci w wieku do 12 lat.

Lek Olej rycynowy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ze względu na działanie przeczyszczające oleju rycynowego, nie zaleca się przyjmowania jednocześnie innych leków, należy zachować kilkugodzinny odstęp czasu przed zastosowaniem innych leków.

Należy informować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat wpływu oleju rycynowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Olej rycynowy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: jednorazowo 1-2 łyżeczek oleju rycynowego (4-8 g).

Dorośli: jednorazowo 1-2 łyżek oleju rycynowego (12-24 g).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Olej rycynowy

Przyjęcie większej dawki niż zalecana może spowodować wystąpienia mdłości, wymiotów, kolki, biegunki, zachwiania równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. W przypadku przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Olej rycynowy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Olej rycynowy

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Olej rycynowy może wywołać podrażnienie jelita cienkiego, przekrwienia jelita grubego i narządów w obrębie miednicy, u osób szczególnie wrażliwych olej rycynowy może wywołać wysypkę.

U niektórych osób w czasie stosowania Oleju rycynowego mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Olej rycynowy

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Olej rycynowy

Substancją czynną leku jest olej rycynowy.

1 g płynu doustnego zawiera 1 g oleju rycynowego.

Jak wygląda lek Olej rycynowy i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnego lub słomkowożółtawego płynu doustnego.

Opakowanie leku to butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową lub aluminiową po 30 g, 40 g, 100 g, 450 g i 950 g produktu. Nie wszystkie opakowania dostępne są w sprzedaży.

Podmiot odpowiedzialny

Polska

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. +48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.

Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią

tel. +48 52 386 73 10, fax +48 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki: