

# Gelsectan®

## Zastosowanie

Wyrób medyczny Gelsectan® jest przeznaczony do stosowania w celu przywrócenia funkcji jelit u pacjentów ze zmianami wywołanymi przez zespół jelita drażliwego (ang. *Irritable Bowel Syndrome*, IBS) związany z nadwrażliwością jelit lub przyjmowaniem niektórych leków, w celu łagodzenia i zapobiegania występowaniu objawów takich jak przewlekła lub nawracająca biegunka, uczucie rozdęcia brzucha, ból brzucha, wzdęcia, wzdęcia z oddawaniem gazów.

## Rodzaje opakowań

Opakowanie z blistrami zawierające 15, 30 lub 60 kapsułek do stosowania przez osoby dorosłe.

## Skład

Ksylogluklan, białko grochu i wyciąg z pestek winogron, ksylo-oligosacharydy, magnezu stearynian (pochodzenia roślinnego) i amorficzna krzemionka strąceniowa.

## Instrukcja użycia

Połknąć kapsułkę popijając płynem.

## Dawkowanie

1 lub 2 kapsułki, w zależności od nasilenia objawów, dwa razy na dobę (rano przed śniadaniem i wieczorem przed kolacją) przez okres 2 do 4 tygodni. W razie potrzeby leczenie można kontynuować.

## Ostrzeżenia

- Nie ma konieczności konsultacji z osobami należącymi do fachowego personelu medycznego przed zastosowaniem produktu. Jednakże taką konsultację zaleca się w przypadku obecności ciężkich lub utrzymujących się objawów lub w razie wątpliwości co do rozpoznania, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.
- Stosowanie niniejszego wyrobu medycznego nie stanowi leczenia farmakologicznego. Jeżeli takie leczenie jest zalecane przez lekarza, wyrób medyczny można stosować równoległe z nim.
- Pomimo, że nie są znane żadne skutki uboczne produktu nie zaleca się jego stosowania w okresie ciąży ani w pierwszych miesiącach karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci innego postępowania.
- Nie stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie stosować produktu w przypadku otwarcia lub uszkodzenia blistra.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.
- Produkt przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## Przeciwwskazania

Wyrobu medycznego nie należy stosować u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na ksylogluklan lub jakiegokolwiek inny składnik produktu wymieniony w punkcie „Skład”.



DEVINTEC SAGL  
Corso Elvezia 14  
6900 Lugano, Szwajcaria



Devintec Health S.L.  
Calle Jimenez, 10  
24767 Herreros de Jamuz  
León (Hiszpania)

