

**Proponowany tekst na opakowaniu zewnętrznym bezpośrednim
(butelka ze szkła barwnego z zakrętką z polietylenu z kroplomierzem z polietylenu)**

Nazwa:

Jodyna

Nazwa powszechnie stosowana

Iodi solutio spirituosas

Roztwór na skórę, 3 %.

Zawartość w opakowaniu: 10 g.

20 g

Skład:

Produkt zawiera:

- Iodum	3,00 g
- Potasu jodek	1,00 g
- Etanol 96%	90,00 g
- Woda oczyszczona	6,00 g

Wskazania do stosowania:

Zewnętrznie w niewielkich uszkodzeniach skóry, takich jak otarcia, zadrapania oraz w celu odkażenia nieuszkodzonej skóry, np. przed zabiegami.

Przeciwwskazania:

Odczyny alergiczne na jod, ciąża, laktacja. Dzieci w wieku noworodkowym i niemowlęcym, nietolerancja glutenu (choroba Duhringa).

Interakcje:

Może zaburzać badania czynności tarczycy, nie stosować ze związkami rtęci.

Działania niepożądane:

Miejscowe odczyny alergiczne. Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wystąpić obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarkę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Chronić oczy. Ostrożnie przy przerwaniu ciągłości skóry, chorobach tarczycy. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

O stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

Droga podania i sposób stosowania:

Otarte miejsca i bezpośrednie okolice ran przemywać 2-3 razy dziennie wacikiem nasączonym lekiem. Nie stosować na otwarte rany.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42

86-031 Osielsko

Numer pozwolenia:

IL – 3130/ChF

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC:

5909994313019

5909994313026

**Proponowany tekst na opakowaniu bezpośrednim
(butelka ze szkła barwnego z zakrętka z polietylenu)**

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Nazwa:

Jodyna

Nazwa powszechnie stosowana

Iodi solutio spirituosa

Roztwór na skórę, 3 %.

Zawartość w opakowaniu: 800 g.

Skład:

produkt zawiera:

- Iodum	3,00 g
-Potasu jodek	1,00 g
- Etanol 96%	90,00 g
- Woda oczyszczona	6,00 g

Wskazania do stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przeciwwskazania:

Odczyny alergiczne na jod, ciąża, laktacja. Dzieci w wieku noworodkowym i niemowlęcym, nietolerancja glutenu (choroba Duhringa).

Interakcje:

Może zaburzać badania czynności tarczycy, nie stosować ze związkami rtęci (antyseptyki, leki moczopędne).

Działania niepożądane:

Miejscowe odczyny alergiczne. Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wystąpić obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub

pielęgniarki. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Chronić oczy. Ostrożnie przy przerwaniu ciągłości skóry, chorobach tarczycy. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

O stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

Droga podania i sposób stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Kategoria dostępności:

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 42
86-031 Osielsko

Numer pozwolenia:

IL – 3130/ChF

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC:

5909994313033