

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA DLA WIELKOŚCI OPAKOWANIA 50 g

KORZEŃ RZEWIENIA

Rhei radix

Postać farmaceutyczna: zioła do zaparzenia

Zawartość opakowania: 50 g

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Korzeń rzewienia (*Rhei radix*) 1 g/1 g

Zawartość związków hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę w 1 dawce (1 g produktu) wynosi 22,8 mg – 25,2 mg.

Wskazania do stosowania:

Zaparcia.

Przeciwwskazania:

Niedrożność jelit, zapalne schorzenia jelit, np. choroba CROHNA, owrzodzenie jelita grubego, zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha o nieznannej etiologii. Dzieci poniżej 12 lat. Okres ciąży i karmienia piersią.

Interakcje:

Przy przewlekłym stosowaniu możliwe jest wskutek niedoboru potasu wzmaganie działania glikozydów sercowych, jak również wpływanie na działanie środków przeciwarrytmicznych. Straty potasu mogą się zwiększać w trakcie jednoczesnego stosowania z tiazydowymi środkami moczopędnymi, steroidami kory nadnerczy i korzeniem lukrecji.

Działanie niepożądane:

W pojedynczych przypadkach kurczowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W tych przypadkach konieczne jest obniżenie dawki. Jeżeli objawy utrzymują się należy zaprzestać stosowania leku. Przy przewlekłym stosowaniu mogą wystąpić straty elektrolitów, szczególnie potasu, białkomocz i krwimocz, odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit (pseudomelanosus coli), które jednakże jest nieszkodliwe i z reguły zanika po odstawieniu surowca. Straty potasu mogą prowadzić do zaburzeń czynności serca i osłabienia mięśni, szczególnie przy jednoczesnym przyjmowaniu glikozydów sercowych, środków moczopędnych i steroidów kory nadnerczy.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Nie stosować przy niezdiagnozowanych objawach chorobowych w obrębie brzucha, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Stosowanie stymulujących środków przeczyszczających, poza krótkotrwałym użyciem, może spowodować osłabienie perystaltyki jelit. Nadmierne użycie powoduje utratę płynów oraz elektrolitów i może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 1 tygodniu stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja:

Nie należy stosować produktu leczniczego podczas ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Brak danych.

Droga podania i sposób stosowania:

Podanie doustne w postaci odwaru:

Dołączony do opakowania kieliszek napełnić produktem do kreski z oznaczeniem 3 ml (1g produktu) a następnie odmierzoną ilość korzenia rzewienia zalać 1 filiżanką ciepłej wody, gotować powoli pod przykryciem 5 min. Odstawić na 15 min., przecedzić. Wypić jednorazowo 1 filiżankę odwaru przed snem.

Korzenia rzewienia nie należy przyjmować przez dłuższy czas (ponad 1-2 tygodni) bez porady lekarza.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności: (miesiąc i rok).....

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL- 1532/LN

Numer serii:

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Zakład Konfekcjonowania Ziół „FLOS”
Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna
98-345 Mokrsko 118

Kod kreskowy EAN UCC

LOGO

Masa netto: 50 g

OZNAKOWANIE OPAKOWANIA DLA WIELKOŚCI OPAKOWANIA 25 g

KORZEŃ RZEWIENIA

Rhei radix

Postać farmaceutyczna: zioła do zaparzania

Zawartość opakowania: 25 g

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Korzeń rzewienia (*Rhei radix*) 1 g/1 g

Zawartość związków hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę w 1 dawce (1 g produktu) wynosi 22,8 mg – 25,2 mg

Wskazania do stosowania:

Zaparcia.

Przeciwwskazania:

Niedrożność jelit, zapalne schorzenia jelit, np. choroba CROHNA, owrzodzenie jelita grubego, zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha o nieznannej etiologii. Dzieci poniżej 12 lat. Okres ciąży i karmienia piersią.

Interakcje:

Przy przewlekłym stosowaniu możliwe jest wskutek niedoboru potasu wzmaganie działania glikozydów sercowych, jak również wpływanie na działanie środków przeciwarytmicznych. Straty potasu mogą się zwiększać w trakcie jednoczesnego stosowania z tiazydowymi środkami moczopędnymi, steroidami kory nadnerczy i korzeniem lukrecji.

Działanie niepożądane:

W pojedynczych przypadkach kurczowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe. W tych przypadkach konieczne jest obniżenie dawki. Jeżeli objawy utrzymują się należy zaprzestać stosowania leku. Przy przewlekłym stosowaniu mogą wystąpić straty elektrolitów, szczególnie potasu, białkomocz i krwiomocz, odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit (pseudomelanosis coli), które jednakże jest nieszkodliwe i z reguły zanika po odstawieniu surowca. Straty potasu mogą prowadzić do zaburzeń czynności serca i osłabienia mięśni, szczególnie przy jednoczesnym przyjmowaniu glikozydów sercowych, środków moczopędnych i steroidów kory nadnerczy.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

Nie stosować przy niezdiagnozowanych objawach chorobowych w obrębie brzucha, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. Stosowanie stymulujących środków przeczyszczających, poza krótkotrwałym użyciem, może spowodować osłabienie perystaltyki jelit. Nadmierne użycie powoduje utratę płynów oraz elektrolitów i może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 1 tygodniu stosowania produktu należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja:

Nie należy stosować produktu leczniczego podczas ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

Brak danych.

Droga podania i sposób stosowania:

Podanie doustne w postaci odwaru:

Dołączony do opakowania kieliszek napełnić produktem do kreski z oznaczeniem 3 ml (1g produktu) a następnie odmierzoną ilość korzenia rzewienia zalać 1 filiżanką ciepłej wody, gotować powoli pod przykryciem 5 min. Odstawić na 15 min., przecedzić. Wypić jednorazowo 1 filiżankę odwaru przed snem.

Korzenia rzewienia nie należy przyjmować przez dłuższy czas (ponad 1-2 tygodni) bez porady lekarza.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności: (miesiąc i rok).....

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL- 1532/LN

Numer serii:

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Zakład Konfekcjonowania Ziół „FLOS”

Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna

98-345 Mokrsko 118

Kod kreskowy EAN UCC

LOGO

Masa netto: 25 g