

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła barwnego – 125 g

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**SYROP Z SULFOGWAJAKOLEM**

**0,39 g/5 ml, syrop**

*Sulfogaiacoli sirupus*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

#### **Skład**

100 g syropu sporządzonego wg receptury FP zawiera:

Sulfogwajakol 6 g

Syrop z owocni pomarańczy gorzkiej 94 g

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

125 g

kod EAN: 5909994006317

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

#### **Sposób i droga podania**

Dzieci w wieku poniżej 6 lat - stosować po konsultacji i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli - 10 ml syropu 3-4 razy na dobę.

Podanie doustne.

Do opakowania dołączona jest miarka.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

**Termin ważności**

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Chronić od światła.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel. 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**Pozwolenie nr IL-0063/ChF**

**13. NUMER SERII**

**Numer serii**

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Działanie**

Wykrztuśne.

**Wskazania do stosowania**

W trudnościach z odkrztuszaniem.

**Przeciwwskazania**

Uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

**Środki ostrożności**

Nie przekraczać zalecanych dawek z uwagi na zawartość etanolu i możliwość podrażnienia przewodu pokarmowego.

**Interakcje**

Brak danych.

**Ciąża i karmienie piersią**

Bezpieczeństwo w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek stosowany zgodnie z zalecanym dawkowaniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie zaleca się stosowania leku bezpośrednio przed lub w trakcie prowadzenia pojazdu, gdyż ze względu na niewielką zawartość alkoholu lek może mieć wpływ na wynik urządzeń kontrolujących poziom alkoholu w powietrzu wydychanym.

**Możliwe działania niepożądane**

W dużych dawkach lek drażni przewód pokarmowy.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21 301, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

**Przedawkowanie**

Brak danych.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

syrop z sulfogwajakolem

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.