

Dermicin® wskazany jest do leczenia niemowlęcego łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy).



Przed zastosowaniem należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki.

Dermicin® wskazany jest do leczenia niemowlęcego łojotokowego zapalenia skóry (ciemieniuchy).

NIEWMŁĘCE ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY

Niemowlęce łojotokowe zapalenie skóry (ciemieniucha) charakteryzuje się występowaniem złuszcających żółto-brązowych zmian skórnych (łusek przypominających strupy), pojawiających się przede wszystkim na owłosionej skórze głowy. Łojotokowe zapalenie skóry może też objąć brwi, powieki, skórę za uszami, fałdy nosowe, kark, okolice pielszuskowe, doły podkolanowe, pachowe, łokciowe.

Uważa się, że przyczyną schorzenia jest nadmierna produkcja łoju skór nego (sebum) przez gruczoły łojowe, często w połączeniu z zakażeniem drożdżakami (*Malassezia*). Niemowlęce łojotokowe zapalenie skóry nie jest spowodowane brakiem higieny ani alergią. Niemowlęce łojotokowe zapalenie skóry to bardzo częste schorzenie. Szacuje się, że występuje ono u około 50% niemowląt.

DERMICIN®

Opakowanie Dermicin® zawiera butelkę z aerozolem o pojemności 30 ml, szczotkę chirurgiczną i grzebień oraz ulotkę informacyjną. Preparat Dermicin® wchłania się w skórę i rozmiękcza łuskę (rozpuszcza tłustą warstwę powstałą w wyniku zasychania łoju). Dermicin® ogranicza utratę wody przez skórę i przywraca funkcję ochronną skóry. Dołączona do opakowania szczotka chirurgiczna i grzebień służą do usuwania i wyczesywania przywierającej, złuszczonej skóry (łusek powstających w wyniku łojotokowego zapalenia skóry). Oleje zawarte w preparacie Dermicin® nie ulegają rozkładowi przez drożdżaki (*Malassezia*) i nie mogą być wykorzystane przez te grzyby jako źródło lipidów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stosować produkt z zachowaniem ostrożności i zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej ulotce. Nie stosować innych produktów, takich jak oliwa z oliwek, w połączeniu z preparatem Dermicin®. W przypadku nadkażenia drożdżakami z gatunku *Malassezia*, oliwa z oliwek może nasilać łojotokowe zapalenie skóry.

NALEŻY UWAŻAĆ, ABY AEROSZOL DERMICIN® NIE DOSTAŁ SIĘ DO OCZU DZIECKA. MOŻE TO POWODOWAĆ DYSKOMFORT. Jeśli preparat Dermicin® dostanie się do oczu dziecka, należy przemyć je czystą, ciepłą wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustąpi, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ DERMICIN®

Zdjąć ochronną nasadkę z butelki z aerozolem. Rozpylić 2-krotnie aeroszol na wewnętrzną część dłoni, następnie nanieść preparat na obszar zmie-

niony przez łojotokowe zapalenie skóry i wmasować. Powtórzyć czynność, jeśli obszar zajęty przez łojotokowe zapalenie skóry jest rozległy, np. w przypadku owłosionej skóry głowy. Ważne, aby zaaplikować odpowiednią ilość preparatu Dermicin® na skórę. Jeśli łojotokowe zapalenie skóry występuje wokół oczu dziecka, aeroszol Dermicin® można rozpylić na wacik, aby ułatwić nanoszenie preparatu na skórę i nie dopuścić do przedostania się preparatu do oczu dziecka. Pozostały na dłoni nadmiar preparatu Dermicin® można wmasować w inne obszary skóry dziecka, ponieważ preparat zapobiega utracie wody przez skórę. Preparat należy stosować codziennie rano i po południu aż do ustąpienia łojotokowego zapalenia skóry. Leczenie zazwyczaj trwa od 1-4 tygodni. Aby usunąć przywierającą, złuszczoną skórę (łuskę), należy BARDZO OSTROŻNIE masować skórę głowy gąbką przymocowaną do szczotki chirurgicznej dołączonej do opakowania, a następnie usunąć złuszczoną skórę za pomocą szczotki chirurgicznej. Grzebień służy do OSTROŻNEGO wyczesywania złuszczonej skóry z włosów dziecka. Należy pamiętać, że skóra dziecka, w tym owłosiona skóra głowy, jest bardzo delikatna. Po zakończeniu leczenia łojotokowego zapalenia skóry może dojść do nawrotu schorzenia. Nawroty mogą występować do 7. miesiąca życia dziecka. W późniejszym okresie życia, rzadko występuje niemowlęce łojotokowe zapalenie skóry. Jeśli wystąpi nawrót łojotokowego zapalenia skóry, należy ponownie zastosować leczenie preparatem Dermicin®.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Dermicin®.



PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 2 do 30°C, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i innych źródeł ciepła. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować preparatu Dermicin® po upływie terminu ważności. Po użyciu należy pamiętać o ponownym nałożeniu nasadki ochronnej na butelkę. Preparat Dermicin® można wyrzucać do domowych pojemników na odpadki.



WYTWÓRCA: Vitamed ApS, Diplomvej 373, DK-2800 Lyngby, Dania. Dermicin® jest znakiem towarowym firmy Unigroup ApS, objętym zgłoszeniem patentowym.

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR NA POLSKĘ:

Vitamed
Ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl
www.vitamedlive.pl



Zawartość opakowania Dermicin®: butelka z aerozolem o pojemności 30 ml (220 rozpyleń), szczotka chirurgiczna do usuwania przywierającej, złuszczonej skóry (łusek) i grzebień do wyczesywania złuszczonej skóry z włosów dziecka. **Skład:** olej z *Borago officinalis* (olej z ogórecznika lekarskiego), skwalan, octan d-alfa-tokoferylu (witamina E), olej z nasion *Helianthus annuus* (olej ze słonecznika zwyczajnego), wyciąg z liści *Rosmarinus officinalis* (wyciąg z rozmarynu lekarskiego). **Zastosowanie:** Leczenie ciemieniuchy (niemowlęcego łojotokowego zapalenia skóry). **Data opracowania ulotki:** 09.2015 r.