

# Ferivag

Apo-laktoferyna LT (Lipid Technology)

Kapsułki dopochwowe  
Wyrób medyczny opatentowany  
14 kapsułek dopochwowych

Ferivag to wyrób medyczny w postaci kapsułek dopochwowych zawierający liposomalną apolaktoferynę. Laktoferyna jest glikoproteiną o właściwościach chelatujących (wiążących) żelazo, która uczestniczy w wielu procesach biologicznych, występuje naturalnie w wydzielinie pochwowej i stanowi ważny element pierwszej linii obrony błon śluzowych dróg rodnych.

Apolaktoferyna (forma laktoferyny wolna od żelaza) ma wyższą aktywność niż laktoferyna, ponieważ wiązanie z żelazem zachodzi w formie otwartej apoproteiny, co pozwala na łatwiejsze połączenie z jonami  $Fe^{3+}$ . Co więcej, nowoczesna technologia mikroenkapsulacji w liposomach pozwala uzyskać nie tylko większą biodostępność, ale także większą ochronę glikoproteiny przed denaturacją (Patent Europejski).

Przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze właściwości apolaktoferyny wynikają z jej zdolności do wiązania wolnego żelaza ( $Fe^{3+}$ ), które jest niezbędne do wzrostu i namnażania drobnoustrojów w środowisku pochwy. Przeciwwirusowe działanie apolaktoferyny wynika z jej zdolności wiązania się do glikozaminoglikanów błony komórkowej, chroniąc w ten sposób przed wnikaniem wirusów i zatrzymując rozwój infekcji.

**Wskazania:** Kapsułki dopochwowe Ferivag to wyrób medyczny do stosowania wspomagającego w leczeniu i profilaktyce infekcji pochwy, takich jak bakteryjne, wirusowe i grzybicze (kandydoza) zapalenie pochwy, stanów zapalnych szyjki macicy oraz we wszystkich przypadkach cząstowego zaburzenia równowagi mikroflory pochwy.

**Zawartość opakowania:** Blister zawierający 14 kapsułek (każda po 550 mg) w tekturowym opakowaniu z ulotką.

**Skład:** Każda kapsułka zawiera skrobię ryżową, apolaktoferynę w sproszkowanych liposomach (100 mg), żelatynę roślinną (składnik kapsułki), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca).

**Sposób użycia:** Zaleca się stosowanie 1 kapsułki 1-2 razy na dzień, wprowadzając ją głęboko do pochwy w pozycji leżącej. Zaleca się stosowanie przez 7 dni. Przed użyciem wyrobu należy umyć ręce.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:** Produkt przeznaczony do stosowania dopochwowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku pediatrycznego. Wyrób należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. U kobiet w ciąży zaleca się konsultację z lekarzem przed zastosowaniem. Jednoczesne stosowanie innych produk-

tów dopochwowych może uniemożliwić skuteczność i bezpieczeństwo wyrobu Ferivag. Nie połykać. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Nie używać produktu po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do nienaruszonego i prawidłowo przechowywanego produktu. Kiedy kapsułka się rozpuści, może spowodować bładoróżowe zabarwienie wydzieliny pochwowej, co wynika z naturalnego koloru apolaktoferyny. Wszelkie działania niepożądane, które nie zostały opisane w tej ulotce, należy zgłaszać lekarzowi lub farmaceutce.

**Przeciwwskazania:** Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników wyrobu. Laktoferyna jest białkiem pozyskiwanym z mleka krowiego, stąd nie zaleca się stosowania w przypadku alergii na białka mleka.

**Przechowywanie:** Przechowywać produkt zamknięty, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w suchym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła.



Należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do opakowania



Wytwórca



Kod wyrobu medycznego



Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C



Nr serii



Data ważności



Należy zapoznać się z Ostrzeżeniami i środkami ostrożności

**Dystrybutor:**



Solinea Sp. z o.o. Sp. K.  
Elizówka 65  
21-003 Ciecierzyn



**Wytwórca:**

TDC Technology Dedicated to Care S.r.l.  
Via Copernico, 38 - 20125 Mediolan (Włochy)

Patent Europejski



REF ES00587DCE2  
rev3 of 20/04/2022