



**„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ  
HASCO-LEK” S.A.**  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

## Instrukcja używania wyrobu medycznego

Należy zapoznać się z treścią instrukcji przed zastosowaniem wyrobu medycznego.

- Należy zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli objawy nasilą się i nie nastąpi poprawa, należy skontaktować się z lekarzem.

### **ULGIX USG** kapsułki miękkie

### **Wyrób medyczny**

#### **Spis treści instrukcji:**

1. Co to jest wyrób medyczny Ulgix USG i dlaczego się go stosuje
2. Jak stosować wyrób medyczny Ulgix USG
3. Przeciwwskazania
4. Środki ostrożności i ostrzeżenia
5. Możliwe działania niepożądane
6. Jak przechowywać Ulgix USG
7. Inne informacje

1 kapsułka żelatynowa wyrobu medycznego Ulgix USG zawiera 500 mg symetykonu.  
Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, żółcień chinolinowa.

#### **1. Co to jest wyrób medyczny Ulgix USG i dlaczego się go stosuje**

Ulgix USG zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu wykazuje wysoką skuteczność w usuwaniu z przewodu pokarmowego gazów i powietrza.

Symetykon jest stabilną mieszaniną polimeru silikonu i dwutlenku krzemu o właściwościach odpinających i adsorbujących gazy jelitowe. Zalecana dawka symetykonu wywołuje wyłącznie działanie powierzchniowe i jest obojętna dla organizmu. Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego, nie powoduje zmiany pH treści pokarmowej, nie zmienia procesów trawiennych i nie zakłóca mechanizmów absorpcji jelitowej. Wydalany jest z organizmu w postaci niezmienionej. Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach. W ten sposób ułatwia ich pękanie i rozbijanie, co usprawnia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie pokarmowym.

Ulgix USG stosowany jest pomocniczo przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej techniką obrazową, takich jak: radiografia, ultrasonografia i endoskopia.

Przyczynia się do usunięcia z przewodu pokarmowego gazów i powietrza, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów i eliminuje trudności diagnostyczne.

Ulgix USG może być stosowany doraźnie w łagodzeniu uciążliwych objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w żołądku i jelitach, powstałych w wyniku fermentacji jelitowej w czasie procesów trawienia. Należą do nich: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie, uczucie rozpierania, które mogą być wynikiem m. in. błędów dietetycznych.

## **2. Jak stosować wyrób medyczny Ulgix USG**

Wyrób medyczny Ulgix USG w postaci kapsułek żelatynowych stosuje się doustnie.

*Przygotowanie do badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej*

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

*Doraźna pomoc w stanach uciążliwego nadmiaru gazów w jelitach, objawiającego się: odbijaniem, silnymi wzdęciami, uczuciem pełności i rozpierania.*

Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka - do 2 razy na dobę.

Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody).

W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

## **3. Przeciwwskazania**

Wyrobu Ulgix USG nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu.

## **4. Środki ostrożności i ostrzeżenia**

Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

Jeśli dotychczasowe objawy utrzymują się lub nasilają i występują nowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe zaleca się konsultację lekarską w celu ustalenia przyczyny i podjęcia leczenia.

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji symetykonu z lekami, jednakże z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania wyrobu medycznego Ulgix USG z lekami.

## **5. Możliwe działania niepożądane**

Brak doniesień o znaczących działaniach niepożądanych związanych ze stosowaniem symetykonu. Sporadycznie u niektórych chorych mogą występować bóle brzucha, biegunka, zaparcie.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek działania niepożądane związane ze stosowaniem wyrobu medycznego, należy je zgłosić wytwórcy.

## **6. Jak przechowywać wyrób medyczny Ulgix USG**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25° C, w miejscu

niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. Inne informacje

Wyrób medyczny Ulgix USG jest dostępny w opakowaniu zawierającym 2, 10 kapsułek miękkich.

### Informacje na opakowaniu jednostkowym



„NUMER SERII”



„UŻYĆ DO”

25°C



„NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA TEMPERATURA”



„ZAJRZYJ DO INSTRUKCJI UŻYWANIA”

### Wyrób medyczny



„WYTWÓRCA”

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

### Logo

#### Informacja o wyrobie medycznym:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E  
[www.hasco-lek.pl](http://www.hasco-lek.pl)

tel.: +48 22 742 00 22

Data wydania instrukcji: 22.05.2017



„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ  
HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Tekst etykiety opakowania zewnętrznego.

**ULGIX USG**  
kapsułki miękkie  
(*Symetykon*)

.....kapsulek  
Wyrób medyczny

**Do stosowania przed badaniami diagnostycznymi**

**Skład**

1 kapsułka żelatynowa zawiera:

500 mg symetykonu

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, zółcień chinolinowa.

**Co to jest wyrób medyczny Ulgix USG i dlaczego się go stosuje**

Ulgix USG zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na skuteczniejsze łagodzenie dolegliwości wywołanych przez silne wzdęcia. Zalecana dawka symetykonu wywołuje wyłącznie działanie powierzchniowe i jest obojętna dla organizmu.

Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego śluzu i pęcherzyków gazów znajdujących się w jelitach. Stosowany przed badaniami diagnostycznymi ułatwia usuwanie nadmiaru nagromadzonych gazów w przewodzie pokarmowym, przez co poprawia jakość uzyskiwanych obrazów.

Ulgix USG stosowany jest:

- w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy jakości obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową,
- do łagodzenia objawów związanych z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie.

**Ważne informacje przed zastosowaniem wyrobu medycznego Ulgix USG**

Wyrobu nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu.

Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

**Instrukcja dotycząca stosowania wyrobu medycznego Ulgix USG**

Wyrób w postaci kapsulek żelatynowych stosuje się doustnie.

**Przygotowanie do badań diagnostycznych**

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

*Doraźna pomoc w stanach uciążliwego nadmiaru gazów w jelitach, objawiającego się: odbijaniem, silnymi wzdęciami, uczuciem pełności i rozpierania*

Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka - do 2 razy na dobę.

Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilością płynu (około 1 szklanka wody).

W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

**Warunki przechowywania**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

25°C



LOT

**Wyrób medyczny**

CE 1434



Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

**Logo**

PPF HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie  
Dział Rejestracji i Badań Klinicznych Leków  
KIEROWNIK

mgr farm. *Margorzata Han-Marek*

19 PAZ 2017



**„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ  
HASCO-LEK” S.A.**  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Tekst etykiety opakowania bezpośredniego (blister)

**ULGIX USG**  
kapsułki miękkie  
Symetykon 500 mg

Wyrób medyczny



LOT



Logo

PPF HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie  
Dział Rejestracji i Badań Klinicznych Leków  
KIEROWNIK  
*Edyta*  
mgr farm. *Małgorzata Han-Marek*

19 PAZ 2017



# Ulgix<sup>®</sup>

Wyrób medyczny, kapsułki miękkie (Symetykon)

USG

10 kapsulek

# Ulgix<sup>®</sup>

Wyrób medyczny  
kapsułki miękkie (Symetykon)

## USG



Do stosowania przed  
badaniami diagnostycznymi

500 mg  
symetykonu

Ulgix<sup>®</sup>

Wyrób medyczny, kapsułki miękkie (Symetykon) 10 kapsulek



Przedsiębiorstwo Produkcji  
Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Zmigrodzka 242 E

Wyrób medyczny CE 1434



v8



Wyrób nie należy stosować, jeśli występuje nadwrażliwość na symetykon lub inny składnik wyrobu. Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji lekarskiej.

**Instrukcja dotycząca stosowania wyrobu medycznego Ulgix USG.** Wyrób w postaci kapsulek żelaznowych stosuje się doustnie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych

W dniu poprzedzającym badanie: 1 kapsułka wieczorem, w dniu badania: 1 kapsułka rano na czczo.

Dotaina pomoc w stanach uciążliwego nadmiaru gazów w jelitach, objawiającego się: odbijaniem, silnymi wzdęciami, uczuciem pełności i rozpiętością

Osoby powyżej 18 roku życia: 1 kapsułka - do razy na dobie. Kapsułki można przyjmować przed posiłkami, po posiłkach i w trakcie posiłków popijając odpowiednią ilość płynu (około 1 szklanka wody). W przypadku pominięcia dawki nie należy podawać podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności.

**Ważni przeciwwskazania**

Przechrupki w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego i niedostępnym dla dzieci.

**Skład** 1 kapsułka żelaznowa zawiera: 500 mg symetykonu

Substancje pomocnicze: żelatyna, glicerol, tlenek chrolinowy.

**Co to jest wyrób medyczny Ulgix USG i dlaczego się go stosuje**

Ulgix USG zawiera symetykon w wysokiej dawce. Dzięki temu zwiększa się efektywność działania preparatu, co wpływa na skuteczniejsze lagodzenie objawów wzdętości i nadmiernej produkcji gazów w przewodzie pokarmowym. Dzięki temu zwiększa się efektywność badania ultrasonograficznego. Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego błony komórkowej i jest obciążony dla organizmu. Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego błony komórkowej i jest obciążony dla organizmu. Symetykon posiada zdolność obniżania napięcia powierzchniowego błony komórkowej i jest obciążony dla organizmu.

**Ważne informacje przed zastosowaniem wyrobu**


Ulgix USG stosowany jest:

- w celu usunięcia gazów i powietrza przed wykonaniem badań diagnostycznych w obrębie jamy brzusznej, dla poprawy jakości obrazów uzyskiwanych techniką radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową.
- do łagodzenia objawów wzdętości z nadmiernym nagromadzeniem gazów w jelitach, takich jak: uczucie pełności, silne wzdęcia, odbijanie.

Ważne informacje przed zastosowaniem wyrobu

PPF HASCO-LEK S.A. Biuro w Warszawie  
Dział Rejestracji i Badań Klinicznych Leków  
KIEROWNIK  
*Malgorzata Han-Marek*  
mgr farm. Malgorzata Han-Marek  
19 PAZ 2017





PPF HASCÓ-ŁEK S.A. Biuro w Warszawie  
 Dział Rejestracji i Badań Klinicznych Leków  
**KIEROWNIK**  
*Magdalena Han-Marek*  
 mgr farm. *Magdalena Han-Marek*

19 PAZ 2017