

# Multiwitamina APTEO

---



## Status:

Suplement diety

## Zastosowanie:

Składniki preparatu wpływają korzystnie na:

- prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego (witaminy: C, B6, B12, D, cynk, miedź, żelazo, foliany, selen)
- zmniejszenie uczucia zmęczenia i znużenia (witaminy: B6, B12, C, magnez, ryboflawina)
- prawidłowe: funkcjonowanie tarczycy (selen, jod) i produkcję hormonów tarczycy (jod)

## Składniki:

tlenek magnezu (magnez); substancja wypełniająca: celuloza; kwas L-askorbinowy (wit. C); substancja wypełniająca: poliwinylpirolidon; octan DL-alfa-tokoferylu (wit. E); fumaran żelaza (żelazo); substancja glazurująca: hydroksypropylometyloceluloza; amid kwasu nikotynowego (niacyna); cholekalcyferol (wit. D); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu; glukonian manganu (mangan); D-

pantotenian wapnia (kwas pantotenowy);  
substancja wiążąca: sól sodowa  
karboksymetylocelulozy, usieciowana;  
substancja zagęszczająca: polidekstroza;  
tlenek cynku (cynk); substancja  
przeciwzbrylająca: talk; cyjanokobalamina  
(wit. B12); ryboflawiny-5'-fosforan sodu  
(wit. B2); siarczan miedzi (miedź);  
substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek  
krzemu; chlorowodorek pirydoksyny (wit.  
B6); średniołańcuchowe trójglicerydy;  
filochinon (wit. K); monoazotan tiaminy  
(wit. B1); kwas pteroilomonoglutaminowy  
(kwas foliowy); pikolinian chromu (chrom);  
jodek potasu (jod); selenian IV sodu  
(selen); D-biotyna (biotyna); molibdenian  
amonu (molibden); barwniki: czerwień  
allura, węgiel roślinny

**Opakowanie:**

60 tabletek

**Zalecane spożycie:**

1 tabletkę dziennie, popijając wodą.

**Informacje ogólne:**

Data minimalnej trwałości i nr partii  
podane są na opakowaniu produktu.

Przechowywanie: w temperaturze 15-25°C,  
w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed światłem i wilgocią.

Zawartość: 60 tabletek powlekanych,  
masa netto 52,9 g

Ostrzeżenie: nie przekraczać zalecanej  
porcji dziennej. Nie stosować w przypadku

uczulenia na któryś ze składników preparatu. Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią. Ważne jest stosowanie zbilansowanej i zróżnicowanej diety oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Preparat nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.