

Cevitt® Gardło


TABLETKI DO SSANIA Z WITAMINĄ C I CYNKIEM

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem preparatu, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

1. Co to jest Cevitt® Gardło i w jakim celu się go stosuje



Tabletki do ssania Cevitt® Gardło to wyrób medyczny do stosowania w przypadku podrażnień wywołujących kaszel oraz podrażnień błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz związanym z nimi bólem gardła, utrudnionym przełykaniem oraz chrypki.

Podczas ssania tabletek Cevitt® Gardło po połączeniu ze śliną w ustach tworzy się hydrożel. Pokrywa on w formie warstwy ochronnej podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła, przez co pozwala jej się zregenerować oraz usmierza ból gardła, znosi trudności w przełykaniu i objawy chrypki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Cevitt® Gardło

Kiedy nie stosować Cevitt® Gardło:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik preparatu,
- w przypadku znacząco ograniczonego wytwarzania śliny, np. w przypadku syndromu Sjögrena,
- jeśli pacjent choruje na fenyloketonurię, ze względu na to, że tabletki zawierają aspartam stanowiący źródło fenylalaniny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tabletki do ssania Cevitt® Gardło zawierają sorbitol. Przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku, gdy pacjent nie toleruje określonych cukrów.

Dzieci

Cevitt® Gardło nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.

Cevitt® Gardło może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 6 roku życia tylko wtedy, gdy dziecko potrafissać tabletkę i nie zachodzi ryzyko niekontrolowanego połknięcia tabletki.

Cevitt® Gardło a inne preparaty, w tym leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich preparatach i lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o tych, które pacjent planuje stosować.

Cevitt® Gardło powoduje tworzenie się warstwy hydrożelu, co może opóźnić resorpcję innych preparatów i leków. Ze względu na cynk zawarty w Cevitt® Gardło może również dojść do obniżenia ich skuteczności. Z tego względu między przyjęciem tabletek Cevitt® Gardło oraz innych preparatów należy zachować odstęp 3 godzin.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tabletek do ssania Cevitt® Gardło.

3. Jak stosować Cevitt® Gardło

Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: należy powolissać 1 tabletkę co 4-5 godzin.

Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki dziennie.

Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: należy powolissać 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

Tabletek do ssania Cevitt® Gardło nie powinno się rozgryzać ani w całości połykać.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Nadmierne stosowanie tabletek do ssania Cevitt® Gardło może prowadzić do rozrzedzenia się stolca i działać przeczyszczająco.

5. Jak przechowywać Cevitt® Gardło

Tabletki do ssania Cevitt® Gardło należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu.

Nie stosować tego preparatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności został podany na tubie oraz na pudełku tekturowym.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Tabletek do ssania Cevitt® Gardło nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć tabletki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cevitt® Gardło

karbomer, ksantan, hialuronian sodu, mannitol, wodorowęglan sodu, sorbitol, kwas cytrynowy, aspartam, witamina C, aromat, cytrynian cynku dwuwodny.

Dzięki obecności substancji pomocniczych witaminy C i dwuwodnego cytrynianu cynku 1 tabletką Cevitt® Gardło zawiera 1,5 mg cynku i 12,00 mg witaminy C.

Jak wygląda Cevitt® Gardło i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, płaskie tabletki do ssania o gładkiej powierzchni.

Cevitt® Gardło jest dostępny po 20 tabletek o smaku cytryny lub szalwi w tubie umieszczonej w tekturowym pudełku.

Wytwórca

Fairpharm Vertriebs GmbH
Am Krebsenbach 5-7
83670 Bad Heilbrunn
Niemcy

Dystrybutor

Alpen Pharma Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 151 lok. 1
02-326 Warszawa
Tel. +48 22 822 22 14
Fax. +48 22 822 22 16

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2017

Symbole użyte na opakowaniu:

 Termin ważności

 Numer serii

 Przestrzegać ulotki dołączonej do opakowania

73710B