

ectossin

Instrukcja użytkowania

Przed zastosowaniem preparatu ECTOSSIN prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących sposobu użytkowania preparatu ECTOSSIN należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.

1. Co to jest ECTOSSIN i jakie ma zastosowanie.

ECTOSSIN jest wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie, naturalną cząsteczkę chroniącą komórki, która wykazuje właściwości łagodzące stany zapalne i stabilizujące błony komórkowe.

ECTOSSIN to pastylki na gardło z ektoiną przeznaczone do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów przeziębienia, suchości w jamie ustnej i gardle oraz chrypki wynikającej z przeciążenia strun głosowych.

Preparat tworzy warstwę ochronną tzw. „Ectoin® Hydro Complex” na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. Pastylki stabilizują błony komórkowe, zmniejszając ryzyko wystąpienia infekcji bakteryjnych i wirusowych jamy ustnej i gardła.

Preparat zwiększa produkcję śliny i łagodzi stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła. Pastylki ECTOSSIN łagodzą objawy ostrego zapalenia gardła takie jak: ból gardła, ból przy przełykaniu i chrypkę. Ponadto preparat ECTOSSIN nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową oraz wspomaga jej regenerację. Preparat zapobiega lub redukuje podrażnienia błon śluzowych i objawy takie jak zmęczenie głosu, łaskotanie w gardle, suchość gardła spowodowane nadmiernym przeciążeniem głosu, alergenami, suchym powietrzem np. w ogrzewanych lub klimatyzowanych pomieszczeniach, zanieczyszczonym powietrzem lub dymem. ECTOSSIN łagodzi podrażnienia oraz zmniejsza odruch kaszlu. ECTOSSIN łagodzi pierwsze objawy takie jak chrypka, suchy kaszel i ból gardła oraz zapobiega ich pogorszeniu dlatego zaleca się rozpoczęcie jego stosowania już przy pierwszych objawach przeziębienia.

Pastylki ECTOSSIN wspomagają swobodne oddychanie oraz nie zawierają cukru.

Skuteczność ECTOSSIN oparta jest w pełni na naturalnych składnikach.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności.

- W trakcie przewlekłych urazów, po operacji lub uszkodzeniu jamy ustnej, preparat ECTOSSIN nie powinien być stosowany.
- Preparatu ECTOSSIN nie należy stosować u dzieci poniżej 6. roku życia ze względu na ryzyko zadławienia.
- Nie należy stosować pastylek w pozycji leżącej ze względu na ryzyko zadławienia.
- Nie używać pastylek pochodzących z uszkodzonego blistra.
- Preparatu ECTOSSIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub którykolwiek ze składników preparatu.
- W przypadku reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania preparatu ECTOSSIN.
- Preparat ECTOSSIN należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

3. O czym należy wiedzieć przed zastosowaniem preparatu ECTOSSIN.

Nie ma danych na temat interakcji między preparatem ECTOSSIN a innymi pastylkami, podawanymi doustnie wyrobami medycznymi lub lekami. Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem innych preparatów na gardło w trakcie stosowania pastylek ECTOSSIN.

4. Sposób użycia preparatu ECTOSSIN.

1 pastylka do ssania co 3 godziny lub w zależności od potrzeb. Nie przyjmować powyżej 10 pastylek dziennie.

5. Możliwe działania niepożądane.

Preparat ECTOSSIN jest dobrze tolerowany. Dotychczas nie stwierdzono żadnych regularnie występujących ani utrzymujących się działań niepożądanych. W przypadku stosowania w nadmiernych ilościach, bardzo rzadko może dojść do wystąpienia efektu przeczyszczającego w związku z zawartością izomaltu.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu poinformuj o tym lekarza, farmaceutę lub dystrybutora produktu.
Jeżeli stan nie ulegnie poprawie lub pogorszy się, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub dystrybutora o wszelkich działaniach niepożądanych zaobserwowanych w związku ze stosowaniem preparatu ECTOSSIN.

W przypadku utrzymywania się lub zaostrzenia objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

6. Jak przechowywać preparat ECTOSSIN.

Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 2-25°C.

Data ważności preparatu ECTOSSIN znajduje się na pudełku i blistrach. Nie należy stosować preparatu ECTOSSIN po upływie daty ważności.

7. Zawartość preparatu ECTOSSIN.

Opakowanie zawiera 24 pastylki.

8. Dodatkowe informacje

Obecnie nie ma danych dotyczących stosowania preparatu ECTOSSIN w czasie ciąży i karmienia piersią. W przypadku ciąży, karmienia piersią lub podejrzenia ciąży przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład: ektoina (Ectoin®), izomalt, sukraloza, mentol, kwas cytrynowy, aromat cytrynowo-miętowy, aromat miodowy, koncentrat z krokosza barwierskiego, syrop glukozowy, woda.









Wytwórca: 
bitop AG
Stockumer Str. 28,
58453 Witten, Niemcy

Dystrybutor:


Solinea Sp. z o.o. Sp.K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska

Stan informacji: 06.2022

Oznaczenie symboli na opakowaniu:

	- znak CE
	- numer partii
	- Wytwórca
	- zapoznać się z instrukcją użytkowania
 EXP	- termin ważności
 2°C - 25°C	- temperatura przechowywania
	- nie używać pastylek pochodzących ze zniszczonego lub przebitego blistra
	- przechowywać w suchym miejscu