

Material/ Material:	<b>ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:</b>		
Wzór/ Artwork:	<b>ULT-005115_4</b>		
Preparat/ Product:	<b>Ranigast S-O-S mleczko x 200 ml</b>		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/ Leaflet size: 120 x 160 mm		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: - Tekst/ Text: Swis721LtCnEU 7 pt, Swis721CnEU 7 pt		
Gramatura/ Weight:	-	Farmakod/ Pharmacode:	-
Kolorystyka/ Colours:	 <b>P 280 C</b>	Opracował/ Prepared by:	20.08.2020 W.Terlicka

# Ranigast®

wyrób medyczny  
zawiesina doustna

**S-O-S**  
**MLECZKO**

- **ZMNIJSZA DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REFLUKSEM ŻOŁĄDKOWO-PRZELYKOWYM (takie jak zgaga i ból brzucha)**
- **ŁAGODZI NADKWAŚNOŚĆ**
- **CHRONI ŚLUZÓWKĘ ŻOŁĄDKA**

## 1. Identyfikacja, skład i przeznaczenie

Wyrób medyczny **Ranigast S-O-S MLECZKO** jest wskazany do stosowania w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przelykowego, takich jak: zgaga oraz ból brzucha.

Wyrób medyczny **Ranigast S-O-S MLECZKO** umożliwia zmniejszanie nadkwaśności, zapobiegając wystąpieniu uczucia pieczenia, bólu brzucha i niestrawności.

Wyrób medyczny **Ranigast S-O-S MLECZKO** jest skuteczny niezależnie od zasadniczej przyczyny problemu. Ponadto można stosować go wspomagająco u pacjentów z zapaleniem żołądka.

## 1.1 Mechanizm działania

Wyrób medyczny **Ranigast S-O-S MLECZKO** zawiera połączenie kilku substancji działających synergistycznie w środowisku żołądka. Szczególny skład preparatu zawierającego: alginian sodu oraz wodorowęglan potasu i węgla wapnia umożliwia jego szybkie działanie.

Alginyiany to polisacharydy uzyskiwane z niektórych gatunków alg morskich. Występują w postaci włókien, które w reakcji z kwaśnym środowiskiem żołądka, szybko ulegają żelifikacji. Powstały żel tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej żołądka.

Połączenie węgla i wodorowęglanu neutralizuje kwasotę soku żołądkowego. Ponadto pecheryki dwutlenku węgla, które powstają w wyniku reakcji z kwasem solnym zos-

tają uwieszone w żelu alginianowym. Przekształca się on w piankę unoszącą się na powierzchni soku żołądkowego i tworzącą barierę, która zmniejsza liczbę epizodów refluksu.

## 1.2 Skład

**Alginian sodu, węglan wapnia, wodorowęglan potasu.**

**Substancje pomocnicze:** wyciąg z imbiru (aromat), olejki eteryczne z imbiru (aromat), aromaty anizu i mleka, woda, karbomer, parahydroksybenzoestan metylowo-sodowy, sukraloza.

Składnik	Zawartość w 15 ml/ 1 łyżce
Alginian sodu	410 mg
Węglan wapnia	51 mg
Wodorowęglan potasu	205 mg

## 2. Opakowanie

Opakowanie zawiera butelkę o pojemności 200 ml.

## 3. Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i młodzież (12–18 lat):

zalecane dzienne dawkowanie to 1 łyżka stołowa (około 15 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem, do momentu ustąpienia objawów.

Dzieci (9–12 lat):

2 łyżeczki (około 10 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem do momentu ustąpienia objawów.

Dzieci (6–9 lat):

1 łyżeczka (około 5 ml) po dwóch głównych posiłkach w ciągu dnia i przed snem do momentu ustąpienia objawów. Jeśli po miesiącu stosowania produktu problem nadal występuje, należy skonsultować się z lekarzem.

Dawki te skutecznie zmniejszają kwasotę soku żołądkowego i zapobiegają refluksowi żołądkowo-przelykowemu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

## 4. Działania niepożądane

Produkt zawiera substancje, które są naturalne i uważane za bezpieczne.

Po zastosowaniu dawek niezbędnych do osiągnięcia efektu terapeutycznego jedynymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi mogą być zaparcie i przemijające nudności.



Jeśli objawy utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.

## 5. Interakcje z suplementami diety i lekami

Nie są znane interakcje wyrobu medycznego **Ranigast S-O-S MLECZKO** z suplementami diety. Jednakże obowiązuje ogólna zasada, że wszystkie leki doustne, suplementy diety, w tym witaminy, składniki mineralne, preparaty ziołowe i homeopatyczne należy przyjmować co najmniej dwie godziny przed lub po przyjęciu wyrobu medycznego **Ranigast S-O-S MLECZKO**.

### 5.1 Interakcje z lekami

Ze względu na lepką postać, niniejszy wyrób medyczny może opóźniać lub ograniczać wchłanianie jednocześnie podawanych leków. W związku z tym przed rozpoczęciem stosowania takiego wyrobu medycznego jak **Ranigast S-O-S MLECZKO** należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli pacjentka stosuje leki antykoncepcyjne. Przyjmowanie produktu nie stanowi przeciwwskazania do stosowania takich produktów leczniczych jak omeprazol, cymetydyna lub cizapryd; w takich przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

## 6. Przechowywanie

Wyrób medyczny **Ranigast S-O-S MLECZKO** należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła lub światła.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyrób należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C.

## 7. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

U dzieci i młodzieży (6–18 lat) produkt można stosować tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne i po konsultacji z lekarzem.

**W okresie ciąży lub karmienia piersią produkt należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.**

Nie przekraczać zalecanej dawki, ponieważ większe ilości mogą doprowadzić do zaparcia lub przemijającej biegunki.

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku przewlekłych zaparć lub biegunki, choroby nerek lub przewlekłej niewydolności serca.

Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 30 kolejnych dni, jeśli objawy utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie przyjmować w przypadku nietolerancji produktu.

Nie przyjmować w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na składniki produktu.

## 8. Termin ważności

Nie przyjmować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności obowiązuje pod warunkiem przechowywania produktu w nienaruszonym opakowaniu. Nie stosować produktu po upływie 3 miesięcy od otwarcia opakowania.

## 9. Utylizacja

Z wyrobem, którego termin ważności upłynął, należy postępować zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.

Nie dopuszczać do przedostania się produktu ani jego opakowania do środowiska.

**Data ostatniej aktualizacji, kwiecień 2020 r.**



SIIT srl  
Via Ariosto 50/60  
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), WŁOCHY

## Dystrybutor:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA  
83-200 Starogard Gdański  
ul. Pełpińska 19



Wyrób medyczny

CE 0426

