

INSTRUKCJA UŻYWANIA

wyrób medyczny

Vedixin

zmętnienie

JODEK POTASU

Sterylny krople do oczu bez środka konserwującego

Czym są krople Vedixin zmętnienie?

Krople Vedixin zmętnienie zawierają w swoim składzie **hialuronian sodu** oraz **jodek potasu**.

Jodek potasu podany miejscowo, działa jako **silny antyoksydant** na powierzchni oka, wychwytyjąc wolne rodniki. Odpowiedzialny jest tym samym za zmniejszenie stresu oksydacyjnego i **ogranicza powstawanie zmętnień** soczewki i ciała szklistego oka.

Cząsteczki **hialuronianu sodu** ze względu na swój ujemny ładunek posiadają zdolność mukoadhezji, w związku z czym podczas mrugania równomiernie rozprowadzane są na powierzchni rogówki oddziałując z warstwą mucynową filmu łzowego, co ma wpływ na poprawę jego stabilizacji jak i poziom nawilżenia powierzchni oka.

W jakim celu stosuje się krople Vedixin zmętnienie?

Krople Vedixin zmętnienie stosuje się w celu **nawilżenia** powierzchni oka oraz w profilaktyce **zmętnień** soczewki i ciała szklistego oka.

Jak często można stosować Vedixin zmętnienie?

W razie potrzeby należy zakropić jedną kroplę do worka spojówkowego. Ponieważ krople **nie zawierają konserwantów**, mogą być używane **codziennie**, również przez użytkowników wszystkich typów **soczewek kontaktowych**. Zwykle zakrapla się 3 - 4 razy dziennie po jednej kropli do worka spojówkowego każdego oka. Przy nasilonych dolegliwościach można zakraplać częściej.

Jak stosować Vedixin zmętnienie?

Krople do oczu **Vedixin zmętnienie** należy stosować tylko zewnętrznie do worka spojówkowego.



1. Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce.
2. Przed każdym użyciem zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza. Nie dotykać końcówek zakraplacza.



3. Lekko odchylić głowę do tyłu.
4. Butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo).



5. Dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu, wkroplić jedną kroplę do worka spojówkowego, naciskając butelkę.



6. Po zakropleniu należy zamknąć powieki i ruszając gałką oczną, rozprowadzić krople na powierzchni oka.
7. Te same czynności powtórzyć dla drugiego oka.

8. Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz. Podczas zakraplania trzeba uważać, by nie dotknąć końcówką zakraplacza powierzchni oka oraz powieki.

9. Po zastosowaniu preparatu nie zakraplać / płucać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.

10. Należy pamiętać, że pomiędzy ściśnięciem butelki a wypłynięciem kropli może minąć kilka sekund. Nie wywierać zbyt silnego nacisku.

11. Przed zakręceniem, butelkę skierować aplikatorem w dół i energicznie potrząsnąć, nie dotykając końcówki zakraplacza, celem usunięcia resztek kropli. Odczekać chwilę przed nałożeniem zakrętki, by butelka zdążyła się odpowietrzyć

Kiedy nie należy stosować Vedixin zmętnienie?

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu.
- Nie stosować w przypadku infekcji bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych.

Co zawiera Vedixin zmętnienie?

Hialuronian sodu 1 mg/ml, jodek potasu 5 mg/ml, kwas borowy, tetraboran sodu, chlorek sodu, woda wysokoczystyszczona.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania Vedixin zmętnienie?

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Okres przydatności produktu do użycia wynosi 3 miesiące po pierwszym otwarciu pojemnika.
- Produktu nie należy stosować dłużej niż 1 miesiąc przy stosowaniu ciągłym i nie dłużej niż 3 miesiące przy stosowaniu nieciągłym (uwzględniając kilkudniowe przerwy podczas aplikacji).
- Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza oka lub innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.
- W przypadku używania innych leków okulistycznych, powinno upłynąć co najmniej 15 minut zanim zakroplimy oczy kroplami **Vedixin zmętnienie**.
- Preparat ten należy podawać jako ostatni.
- Wyrób medyczny do wielokrotnego użytku powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.
- Nie stosować u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy.

Zgłaszanie incydentów medycznych lub działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Incydenty medyczne lub działania niepożądane można zgłaszać Producentowi wypełniając przygotowany formularz, który jest dostępny na stronie internetowej firmy <http://www.s-lab.pl/> lub listownie na adres: SUPROBION Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków. Incydenty medyczne można zgłaszać bezpośrednio Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, Faks: +48 22 492 11 29

Dostępne opakowania: krople do oczu 10 ml

 SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Kiełczowska 2
55-095 Mirków

Dystrybutor:
Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.
ul. Nocznickiego 31
01-918 Warszawa

11332A_PL
Data opracowania instrukcji: 09.2023



STERILE A