

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

### **MAŚĆ NA ODCISKI, (400 mg + 100 mg)/g, maść** *Acidum salicylicum + Acidum lacticum*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

#### **Spis treści ulotki**

1. Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski
3. Jak stosować lek Maść na odciski
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Maść na odciski
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Maść na odciski i w jakim celu się go stosuje**

Maść na odciski zawiera substancje czynne kwas salicylowy i kwas S-mlekowy oraz substancje pomocnicze - plaster nostrykowy i lanolinę.

Lek po zastosowaniu na odcisk działa keratolitycznie (złuszcząco), zmiękcza i rozpułchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczenie oraz działa miejscowo przeciwzapalnie.

#### **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Maść na odciski**

##### **Kiedy nie stosować leku Maść na odciski:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas salicylowy, kwas mlekowy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli skóra w otoczeniu odcisku jest uszkodzona lub zmieniona zapalnie,
- u pacjentów z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia,
- u dzieci.

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Maść na odciski należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry lub uczulenie.

Lek należy nakładać wyłącznie na odcisk. Nie należy stosować leku na niezmieloną zdrową skórę, ani na skórę uszkodzoną, gdyż mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Unikać kontaktu maści z oczami i błonami śluzowymi.

##### **Maść na odciski a inne leki**

Nie są znane interakcje wynikające z miejscowego i krótkotrwałego zastosowania leku zgodnie ze

wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie badano bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i kobiet karmiących piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## **3. Jak stosować lek Maść na odciski**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na odciski.

Odcisk wymoczyć i osuszyć. Nałożyć na odcisk cienką warstwę maści i zabezpieczyć plastrem lub bandażem. Stosować lek przez 4 do 6 dni rano i na noc, nie zmywając posmarowanych miejsc wodą. Następnie odcisk należy dobrze wymoczyć w gorącej wodzie i usunąć. Nie należy wycinać ani wyrywać odcisków. W razie braku efektów powtórzyć leczenie po upływie 3 dni.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Maść na odciski**

Przedawkowanie leku, zastosowanie na skórę wrażliwą lub uszkodzoną bądź nałożenie na błony śluzowe mogą doprowadzić do miejscowego uszkodzenia tkanek. W razie przypadkowego spożycia leku należy skontaktować się z lekarzem.

### **Pominięcie zastosowania leku Maść na odciski**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Stosowanie leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym dawkowaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie i objawy nadwrażliwości skóry.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail:

[ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Maść na odciski**

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Maść na odciski**

- Substancjami czynnymi leku są: kwas salicylowy, kwas (S)-mlekowy.  
1 g maści zawiera 400 mg kwasu salicylowego i 100 mg kwasu (S)-mlekowego.
- Pozostałe składniki leku to: plaster nostrykowy, lanolina.

### **Jak wygląda lek Maść na odciski i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać maści barwy żółtej lub zielonkawej o charakterystycznym zapachu.  
Opakowanie leku to tuba zawierająca 10 g maści.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel.: 22 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

**Data ostatniej aktualizacji ulotki:**