

## ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA

Informacje dla użytkownika wyrobu medycznego

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla użytkownika.

Należy zawsze stosować **LARIMAX<sup>®</sup> T spray** dokładnie tak, jak to opisano w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

### SKŁAD

Olej roślinny [89,9%], olej z rokitnika zwyczajnego [*Oleum Hippophaes*], olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka [*Oleum Calendulae*] oraz olejek bergamotowy [*Oleum Bergamii*].


### DZIAŁANIE I ZASTOSOWANIE

**LARIMAX<sup>®</sup> T spray** jest produktem opracowanym na bazie oleju i zawiera naturalne olejki, które powlekają jamę ustną i błonę śluzową gardła. Składniki aktywne pomagają w utrzymaniu wilgotności i elastyczności błony śluzowej, zmniejszą dolegliwości ból, uczucie drapania i chropowatości w gardle, ułatwiając połykanie.

Produkt stosowany jest w celu zmniejszenia podrażnienia jamy ustnej i błony śluzowej gardła po różnego rodzaju zabiegach lub w przypadku stanu zapalnego.

## JAK KORZYSTAĆ Z LARIMAX<sup>®</sup> T SPRAY?

1.




Wstrząśnij butelką.

2.




Weź do ręki butelkę i skieruj dyszę dozownika w stronę jamy ustnej.

3.



Obróć dyszę dozownika o 90° w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara.

4.



Umieść dyszę dozownika w jamie ustnej, jak na rysunku.

Za pierwszym razem naciśnij dozownik **LARIMAX® T spray** 2-3 razy. Trzymaj butelkę w pozycji pionowej. Przy jednorazowym naciśnięciu dozownika zostaje rozpylone około 200 mg produktu.

Po użyciu oczyść dyszę dozownika jednorazową chusteczką i obróć ją do pozycji wyjściowej.

Produkt ze względów higienicznych jest przeznaczony do stosowania przez jednego użytkownika.

**Produkt należy stosować 3 razy dziennie.** W celu zapewnienia przedłużonego efektu osłonowego, nie zaleca się stosowania produktu podczas spożywania posiłku lub w czasie picia.

Produkt należy stosować do czasu ustąpienia objawów choroby, ale jeśli objawy (dyskomfort, ból gardła) nie ustąpią po tygodniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

**Uwaga! Produkt może pozostawiać plamy na odzieży.**

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

Nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników produktu. Unikać kontaktu z oczami! Jeżeli nastąpi przypadkowy kontakt z oczami, natychmiast przepłukać oczy bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem. Może być stosowany u dzieci powyżej 2. roku życia. Dzieci poniżej 6. roku życia powinny stosować produkt pod nadzorem osoby dorosłej.

Nie ma żadnych informacji na temat działań niepożądanych przy stosowaniu produktu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

### **PRZECHOWYWANIE**

W suchym, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 3 miesięcy. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.



**SIA „SILVANOLS”**

Kurbada 2A, Ryga,

LV-1009, Łotwa,

[www.silvanols.com](http://www.silvanols.com)

Dystrybutor:

**TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.**

ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice

[www.tactica.pl](http://www.tactica.pl)

### **W opakowaniu**

20 ml butelka z dozownikiem.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

03/2021

Zawartość netto: 20 ml

### **Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:**



- Dane wytwórcy.



- Należy zapoznać się z treścią instrukcji używania.



- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami zamieszczonymi w instrukcji używania.

