

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję używania. Należy zachować instrukcję, aby w razie konieczności móc ją ponownie przeczytać. W przypadku pytań należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

junior-angin

SPRAY DO GARDŁA

od 3 roku życia

Jak działa junior-angin Spray do gardła?

Kaszlowi często towarzyszy podrażnienie i/lub stan zapalny gardła, co może wywołać jego nasilenie i doprowadzić do dalszego bólu gardła oraz dyskomfortu.

Spray do gardła jest wyrobem medycznym, który zawiera miód w swoim składzie, łagodzi kaszel i ból gardła. Tworzy w gardle film ochronny, który powleka podrażnioną błonę śluzową i tym samym łagodzi kaszel.

Co należy wiedzieć przed zastosowaniem?

junior-angin Spray do gardła nie może być stosowany w następujących przypadkach:

- jeśli Ty lub Twoje dziecko wykazujecie nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu,
- jeśli kaszel u Ciebie lub u Twojego dziecka jest spowodowany przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą, rozedmą płuc, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) lub jeśli podczas kaszlu produkowane są duże ilości śluzu,
- jeśli przewlekły lub nawracający kaszel u Ciebie lub u Twojego dziecka jest spowodowany zgałą lub rozstrojem żołądka.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

- Ty lub Twoje dziecko cierpicie na cukrzycę (3 rozpylenia odpowiadają około 0,05 wymiennika węglowodanowego),
- kaszel nasila się podczas leczenia,
- występuje uporczywy kaszel z obfitą produkcją śluzu i/lub wysoka gorączka,
- występuje przedłużająca się chrypka lub problemy z głosem,
- Ty lub Twoje dziecko macie poważne trudności z polykaniem,
- Ty lub Twoje dziecko zauważycie nieprzyjemny efekt po użyciu sprayu,
- spray przypadkowo dostanie się do oczu.

Kto może stosować junior-angin Spray do gardła?

Spray może być stosowany przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 3 roku życia. W przypadku dzieci spray należy zawsze podawać pod nadzorem osoby dorosłej.

Spray jest wyrobem medycznym, a nie zabawką.

Bezpieczeństwo stosowania preparatu podczas ciąży i karmienia piersią nie jest znane. Przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.


Stosowanie junior-angin Spray do gardła z innymi metodami leczenia lub produktami:

Nie są znane interakcje z innymi produktami na kaszel, jeśli są one stosowane zgodnie z instrukcją używania. Zaleca się jednak konsultację z farmaceutą lub lekarzem przed połączeniem sprayu z innymi metodami leczenia.


Jak stosować junior-angin Spray do gardła?

Mocno wstrząsnąć przed użyciem.


- Należy trzymać element kształtem przypominający uszy słonia tak, aby mniejsza część uszu była skierowana w dół. Nałożyć pierścień na szyjkę butelki i docisnąć do momentu, gdy nie będzie widoczna żadna szczelina.




- Wcisnąć dyszę do głowicy rozpylającej aż do usłyszenia kliknięcia.



- Obrócić dyszę poziomo tak, aby była ułożona w pozycji równoległej do podłoża i usunąć przezroczystą nasadkę z końcówki dyszy.



- Spryskać bezpośrednio tylną część gardła. Spryskiwać gardło 2 do 3 razy co 3 godziny lub w zależności od potrzeb. Po użyciu z powrotem nałożyć nasadkę na dyszę.



Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem medycznym, produktami wadliwymi lub podrobionymi należy zgłaszać dystrybutorowi, producentowi lub właściwemu organowi. W ten sposób wspierasz nas w zapewnieniu bezpieczeństwa i skuteczności produktów.

Jak należy przechowywać junior-angin Spray do gardła?



Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.



Spray należy przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie sprayu i opakowaniu zewnętrznym.



Po pierwszym otwarciu okres przydatności sprayu wynosi 6 miesięcy. Nie należy przekraczać daty ważności.

Skład: Polysac-Active® (miód UE), woda, chlorek sodu, sorbinian potasu, ekstrakt z chrząstnicy kędzierzawej, aromat wiśniowy, kwas cytrynowy.

 polysacactive™

Zawartość opakowania: butelka 20 ml, głowica rozpylająca z dyszą, element „uszy słonia” i instrukcja używania

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Dystrybutorem:

Telefon: +48 (22) 231 82 87

E-mail: biuro@klosterfrau.pl



Medical Brands Developments B.V.
Weesperstraat 114
1112 AP Diemen, Nederlandy



M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa, Polska

Podmiot Grupy



Ostatnia aktualizacja instrukcji używania: październik 2024.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Okres przydatności po pierwszym otwarciu



Wyrób medyczny



Data ważności



Oznaczenie partii



Należy przestrzegać instrukcji używania.



Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone



Zakres temperatur 15-25°C



Producent



Dystrybutor



Ostrożnie



0477 Oznakowanie CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej biorącej udział w procedurze oceny zgodności. Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymagania obowiązującego rozporządzenia europejskiego.