

Ulotka dołączona do opakowania:
Informacje dla użytkownika wyrobu
medycznego.

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla użytkownika.

Należy zawsze stosować **OLIT** spray dokładnie tak, jak to opisano w ulotce lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Produkt stosowany jest w celu zmniejszenia podrażnienia jamy ustnej i błony śluzowej gardła po różnego rodzaju zabiegach lub w przypadku stanu zapalnego.


Skład: olej roślinny (89,5%), olej z rokitnika zwyczajnego (*Oleum Hippophaes*), olejowy ekstrakt z kwiatu nagietka (*Oleum Calendulae*), olejek tymiankowy (*Oleum Thymi*) i ekstrakt z rozmarynu (*Extractum Rosmarini*).

Działanie i zastosowanie: **OLIT** spray jest produktem opracowanym na bazie oleju i zawiera naturalne olejki, które powlekają jamę ustną i błonę śluzową gardła. Składniki aktywne pomagają w utrzymaniu wilgotności i elastyczności błony śluzowej, zmniejszają dolegliwości i ból, uczucie drapania i chropowatości w gardle, ułatwiając połykanie.


JAK KORZYSTAĆ Z OLIT SPRAY?




Wstrząśnij butelką.



Obróć dyszę dozownika o 90° w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara.



Weź do ręki butelkę i skieruj dyszę dozownika w stronę jamy ustnej.



Umieść dyszę dozownika w jamie ustnej, jak na rysunku.

Za pierwszym razem naciśnij dozownik **OLIT** spray 2-3 razy. Trzymaj butelkę w pozycji pionowej. Przy jednorazowym naciśnięciu dozownika zostaje rozpylone około 200 mg produktu. Po użyciu oczyść dyszę dozownika jednorazową chusteczką i obróć ją do pozycji wyjściowej.

Produkt ze względów higienicznych jest przeznaczony do stosowania przez jednego użytkownika.

Produkt należy stosować 3 razy dziennie. W celu zapewnienie przedłużonego efektu osłonowego, nie zaleca się stosowania produktu podczas spożywania posiłku lub w czasie picia.

Produkt należy stosować do czasu ustąpienia objawów choroby, ale jeśli objawy (dyskomfort, ból gardła) nie ustąpią po tygodniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Uwaga! Produkt może pozostawiać plamy na odzieży.

Środki ostrożności: nie należy stosować, jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek ze składników produktu. Unikać kontaktu z oczami! Jeżeli nastąpi przypadkowy kontakt z oczami, natychmiast przepłukać oczy bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.

Dane dotyczące stosowania u dzieci i kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią są ograniczone, dlatego w powyższych przypadkach produkt należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Nie stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.

Nie ma żadnych informacji na temat działań niepożądanych przy stosowaniu produktu. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywanie: w suchym, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci miejscu. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (15-25°C). Po otwarciu produkt powinien być zużyty w ciągu 3 miesięcy. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu.



SIA „SILVANOLS”, Kurbada 2A,
Ryga, LV-1009, Łotwa,
www.silvanols.com

Dystrybutor:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.,
ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice
www.tactica.pl

W opakowaniu:

butelka z dozownikiem, zawartość netto 20 ml.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:
03/2021

Objaśnienia symboli użytych na opakowaniu zewnętrznym:



- Dane wytwórcy.



- Należy zapoznać się z treścią instrukcji używania.



- Należy zapoznać się z ostrzeżeniami zamieszczonymi w instrukcji używania.