

ZATOXIN® INHALACJE

roztwór do inhalacji

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Wskazania:

ZATOXIN® INHALACJE, roztwór do inhalacji to wyrób medyczny do stosowania wziewnego, składający się z hipertonicznego roztworu opartego na ekstraktach ziołowych: melisy lekarskiej *Melissa officinalis*, pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* i macierzanki piaszkowej *Timo serpylllo*, w połączeniu z kwasem hialuronowym.

Roztwór do inhalacji ZATOXIN® INHALACJE jest wskazany, aby przeciwdziałać i zapobiegać objawom wynikającym ze zmian w trofizmie nabłonka oddechowego, takich jak kaszel, wyciek z nosa, ból typowy dla zespołu objawów grypy, ale także związanym z alergiami zewnętrznymi. Konsekwencją tych stanów jest zmniejszenie normalnego nawilżenia błony śluzowej i w rezultacie zmniejszenie klirensu śluzowo-rzęskowego, co powoduje powstanie błędnego koła, mogącego prowadzić do niedrożności dróg oddechowych oraz infekcji wirusowych i bakteryjnych.



Dlatego też nebulizacja substancją nawilżającą, taką jak kwas hialuronowy, jest właściwym podejściem terapeutycznym do przywrócenia poziomu nawilżenia, przynosząc ulgę podrażnionej błonie śluzowej. Hipertoniczność roztworu przyczynia się do nawilżenia, umożliwiając upłynnienie i usunięcie śluzu. Wybrane ekstrakty ziołowe wykazują działanie antyoksydacyjne i łagodzące, przyczyniając się do przywrócenia fizjologicznej równowagi błony śluzowej dróg oddechowych.

Nebulizacja roztworem do inhalacji ZATOXIN® INHALACJE jest również optymalna do oczyszczania jamy nosowej i górnych dróg oddechowych.

Roztwór do inhalacji ZATOXIN® INHALACJE jest sterylny, nie zawiera konserwantów i jest gotowy do użycia.

Instrukcja użycia:

1. Roztwór gotowy do użycia, nie rozcieńczać;
2. Roztwór do jednorazowego użycia;
3. Przed rozpoczęciem nebulizacji wydmuchać nos;
4. Oddzielić jednodawkową fiolkę od paska zawierającego 5 fiolek;
5. Przed użyciem delikatnie wstrząsnąć jednodawkową fiolką;
6. Przekręcić i oddzielić wieczko od fiolki;
7. Delikatnie nacisnąć jednodawkową fiolkę i umieścić wskazaną ilość roztworu w pojemniku nebulizatora;
8. Produkt może być używany zarówno z nebulizatorem tłokowym, jak i ultradźwiękowym;
9. Podczas nebulizacji oddychać regularnie, czas trwania nebulizacji około 5-6 minut;
10. Nie używać żadnych pozostałości w fiolce i / lub w pojemniku nebulizatora powtórnie;



Skład:

Suchy wyciąg z melisy lekarskiej *Melissa officinalis* (kwas rozmarynowy $\geq 12\%$), suchy wyciąg z pachnotki zwyczajnej *Perilla frutescens* (polifenole $\geq 2,5\%$), suchy wyciąg z macierzanki piaszkowej *Timo serpylllo*, kwas hialuronowy, chlorek sodu 2%, jednowodny jednozasadowy fosforan sodu, dwuwodny dwuzasadowy

fosforan sodu, maltodekstryna, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona do 100 ml.

Dawkowanie:

Do nebulizacji stosować 3 ml fiolkę, 1 – 2 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza, bez rozcieńczania. Produkt może być używany z nebulizatorami tłokowymi i ultradźwiękowymi.

Opakowanie:

Opakowanie zawiera 10 jednodawkowych fiolek po 3 ml, w dwóch paskach po 5 fiolek.

Ostrzeżenia:

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do inhalacji, nie spożywać ani nie stosować w inny sposób niż wskazany w instrukcji używania.
- Nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub fiolki nie są w stanie nienaruszonym.
- Stosowanie w okresie ciąży, karmienia piersią i u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
- Nie stosować poniżej 2 roku życia, ponieważ w tym wieku cechy fizjologiczne dróg oddechowych wiążą się z ograniczoną zdolnością odprowadzania śluzu z oskrzeli.
- Przed użyciem należy dokładnie umyć ręce.
- Nie dotykać końcówką fiolki innych powierzchni podczas wlewania roztworu do pojemnika.
- Nie stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
- W przypadku dolegliwości, takich jak skurcz oskrzeli, kaszel lub uczucie podrażnienia podczas stosowania, należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.
- Podawanie leków drogą wziewną jednocześnie z roztworem do inhalacji powinno odbywać się pod

nadzorem lekarza, który może ocenić możliwe interakcje.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać produktu po upływie terminu ważności wskazanego na opakowaniu.
- Po otwarciu fiolki natychmiast wlać zawartość do nebulizatora; nie używać ponownie pozostałego roztworu.
- Po użyciu produktu należy właściwie zutylizować opakowanie.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne, temperatura nie powinna przekraczać 25°C.
- Nieużywane fiolki należy przechowywać w pudełku.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek poważnych incydentów dotyczących wyrobu, konieczne jest zgłoszenie zdarzenia producentowi, aby uzyskać więcej informacji o bezpieczeństwie tego wyrobu medycznego.

Okres ważności:

36 miesięcy przy nienaruszonym opakowaniu.

Producent:

Enable Innovations S.R.L. - Via Claudio Tolomeo n°20//4; 41012 Carpi (MO), Włochy

Dystrybutor:

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice
www.tactica.pl, www.zatoxin.pl



TACTICA
PHARMACEUTICALS

Data ostatniej aktualizacji:

Rev. 00 Marzec 2019

 MEDICAL DEVICE 				
WYRÓB MEDYCZNY STERYLNY A	NIE PRZECZOWYWAĆ W TEMPERATURZE POWYŻEJ 25°C	NIE UŻYWAĆ, JEŚLI OPAKOWANIE JEST USZKODZONE	PO UŻYCIU PRODUKTU NALEŻY WŁAŚCIWIE ZUTYLIZOWAĆ OPAKOWANIE	PRODUKT JEDNORAZOWEGO UŻYTKU