



TOPINULIN AKTIV suplement diety

**Z chromem i jodem.
Wspomaga proces odchudzania.**

OPIS Wspomaga proces odchudzania.

Suplement diety Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem w postaci tabletek jest produktem przeznaczonym dla osób dorosłych, który stosowany jest w celu wspierania procesu odchudzania. Na co jest Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem? Wskazaniem do stosowania suplementu diety od Farmapol jest uzupełnienie zdrowej diety w sproszkowane bulwy topinamburu, jod i chrom. Topinambur wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała, poza tym wspiera pracę układu odpornościowego. Morszczyzn pęcherzykowaty wspomaga odchudzanie i utrzymanie prawidłowej masy ciała, a przy tym przyczynia się do zwiększenia uczucia sytości. Dodatkowo wspomaga prawidłową pracę jelit i ich kondycję zdrowotną, a przy tym wspiera funkcje trawienne i regularność wypróżnień. Jod wspomaga prawidłowy metabolizm energetyczny, a chrom wspiera utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

W opakowaniu znajduje się 50 tabletek Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem. W skład 1 tabletki suplementu diety wchodzi 2 g sproszkowanych bulw topinamburu oraz 15 mg ekstraktu z morszczyku pęcherzykowatego (w tym 150 µg (100% RWS) jodu), a także 40 µg (100% RWS) chromu. W składzie suplementu diety Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem znajdują się również substancje pomocnicze. Można do nich zaliczyć sole magnezowe kwasów tłuszczowych oraz aromat. Suplement diety należy stosować zgodnie z rekomendowanym dawkowaniem i nie należy wskazywać dawek modyfikować. Zalecane dawkowanie Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem to 4 tabletki przyjmowane 1 raz dziennie. Tabletki powinny być przyjmowane przed jedzeniem i należy popijać je niewielką ilością płynu. Zalecane jest stosowanie suplementu diety w 2-3 cyklach 20-30 dniowych, między którymi powinno się zachować odstęp przynajmniej 2 tygodni.

Suplementu diety Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem nie można traktować jako zamiennika zróżnicowanej diety i prowadzenia zdrowego trybu życia. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem w sprawie ewentualnej suplementacji produktu. Tabletki Topinulin® Aktiv z Chromem i Jodem powinny być przechowywane poza zasięgiem dzieci.

OPAKOWANIE 50 tabletek a 0,5 g

SKŁADNIKI sproszkowane bulwy topinamburu (słonecznika bulwiastego, *Helianthus tuberosus* L.), substancja przeciwzbrylająca (sole magnezowe kwasów tłuszczowych), ekstrakt z morszczyku pęcherzykowatego (źródło jodu), aromat, chlorek chromu (III).

Porcja 4 tabletek (porcja dzienna) zawiera:	
sproszkowane bulwy topinamburu (słonecznika bulwiastego)	2 g
ekstrakt z morskoczynu pęcherzykowatego, w tym jod	15 mg 150 µg
chrom	40 µg

* RWS – referencyjna wartość spożycia

PORCJA DZIENNA

Przeznaczony dla osób dorosłych.

Zaleca się przyjmowanie 1 raz dziennie 4 tabletki przed jedzeniem popijając małą ilością płynu.

Zaleca się 2-3 cykle po 20-30 dni.

Odstęp między cyklami 2 tygodnie.

OPIS SKŁADNIKÓW

Słonecznik bulwiasty przyczynia się do utrzymania prawidłowej wagi, korzystnie wpływa na system odpornościowy i wspomaga go przed działaniem szkodliwych czynników środowiska.

Morskoczyn pęcherzykowaty wspomaga proces odchudzania, wspomaga utrzymanie wagi, pomaga zwiększyć uczucie sytości i pełności, utrzymuje prawidłowe funkcje jelit, wspiera utrzymanie jelit w zdrowiu, pomaga wspierać trawienie, wspomaga regularne wypróżnianie.

Jod przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

Chrom przyczynia się do utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi, utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się przyjmowanie 1 raz dziennie 4 tabletki przed jedzeniem popijając małą ilością płynu.

Zaleca się 2-3 cykle po 20-30 dni.

Odstęp między cyklami 2 tygodnie.

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE

Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zrównoważony sposób żywienia i prowadzić zdrowy tryb życia.

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

W okresie ciąży i karmienia piersią decyzję o stosowaniu powinno się konsultować z lekarzem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed dostępem światła i wilgoci.

PRODUCENT

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Farmapol Sp. z o.o.
ul. Święty Wojciech 29, 61-749 Poznań

