2D2A-ED3ed9
-DFA0-E9WN-B8A4

Caphosol

EN

1 box contains 32 doses treatment
1 dose treatment = 2 single-dose containers, each 15 ml, mixed together

- Pharmaceutical form: Mouth Rinse, Aqueous solution. Caphosol is a preparation comprising two separately packaged aqueous solutions, a phosphate solution (Caphosol A) and a calcium solution (Caphosol B) which, when both diluted are combined in equal volumes, forms a supersaturated calcium phosphate solution in both solutions and phosphate ions.
- Ingredients/Composition: Sodium Phosphate 0,053, Monobasic Sodium Phosphate 0,000, Calcium Chloride 0,052, Sodium Chloride 0,269, Purified water qs (%w/w)
- Actions: Caphosol is an electrolyte solution designed to moisten, lubricate and clean the oral cavity including the mucosa of the mouth, tongue and oropharynx.
- Indications: Caphosol is indicated for dryness of the mouth and oropharynx (hypposalivation, xerostomia), regardless of the cause and regardless of whether the condition is temporary or permanent. Caphosol is also indicated as an adjunct to standard oral care in the prevention and treatment of the mucositis that may be caused by radiation or high dose chemotherapy. Relief of dryness of the oral mucosa in these conditions is associated with amelioration of pain.
- Directions for use:
  (1+2) Fill 2 single-dose Caphosol A and 1 single-dose Caphosol B in a clean glass.
  (3) Swish in the mouth thoroughly for 1 min with 1/2 of the solution and spit out.
  (3) Repeat with the remaining 1/2 of the solution and spit out.
  Use immediately after mixing the single-dose containers.
- Dosage: 4 to 10 times a day. Use for the duration of the treatment or as instructed by physician.
- Interactions with other treatments: There are no known interactions with medicinal or other products.
- Special precautions for use: Avoid eating or drinking for at least 15 minutes after use. Do not use if the seal of the single-dose container is broken or the single-dose container shows signs of leakage or damage. Contains sodium (71 mg per 30 ml dose treatment). Patients restricted to a low sodium diet should consult their physician before use. Keep out of the reach of children. Do not inject. Do not freeze. No adverse effects are anticipated if Caphosol is swallowed accidentally.

Reporting of side effects
If you get any side effects or adverse incidents, talk to your doctor, pharmacist or nurse. You can also report side effects or adverse incidents directly to the manufacturer via email to RRDpharmacovigilance@recordati.com or to your local health authority. By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of this medicinal device.

FR

1 boîte contient 32 doses de traitement
1 dose de traitement = 2 récipients unidoses de 15 ml chacun, mélangés ensemble

- Forme pharmaceutique : Solution pour bain de bouche, Solution aqueuse. Caphosol est une préparation composée de deux solutions aqueuses sous conditionnements séparés, une solution de phosphate (Caphosol A) et une solution de calcium (Caphosol B). Lorsque les deux solutions sont mélangées à volume égal, elles forment une solution sursaturée à la fois en ions calcium et en ions phosphate.
- Ingrédients : 0,052 d'hydrogénophosphate de sodium, 0,000 de dihydrogénophosphate de sodium, 0,052 de chlorure de calcium, 0,269 de chlorure de sodium, eau purifiée qs (%m/m).
- Actions : Caphosol est une solution électrolytique conçue pour humidifier, lubrifier et nettoyer la cavité buccale, y compris les muqueuses de la bouche, de la langue et de l'oropharynx.
- Indications : Sécheresse de la bouche et de l'oropharynx (hypposalivation, xérostomie), quelles qu'en soient la cause et le durée, temporaire ou permanente. Caphosol est notamment indiqué comme adjuvant aux traitements standards d'hygiène buccale pour la prévention et le traitement de la mucite causée par une radiothérapie ou une chimiothérapie à haute dose. Le soulagement de la sécheresse de la muqueuse buccale dans ces conditions est associé à une diminution de la douleur.
- Mode d'administration :
  (1+2) Mélanger 1 unidose Caphosol A et 1 unidose Caphosol B dans un verre propre.
  (3) Rincer la bouche soigneusement pendant 1 minute avec la moitié de la solution et recracher.
  (3) Répéter avec le reste de la solution et recracher. Utiliser immédiatement après avoir mélangé les deux récipients unidoses.
- Posologie : 4 à 10 bains de bouche par jour. Utiliser pour la durée du traitement ou selon les instructions du médecin.
- Interactions avec d'autres traitements : Il n'y a pas d'interaction connue avec d'autres médicaments ou produits.
- Précautions particulières d'emploi : Éviter de manger ou boire pendant au moins 15 minutes après utilisation. Ne pas utiliser le récipient unidose s'il n'est plus scellé ou s'il présente des signes de fuite ou de dommage. Contient du sodium (71 mg par dose de traitement de 30 ml). Les patients suivant un régime alimentaire pauvre en sodium doivent consulter leur médecin avant utilisation. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas injecter. Ne pas congeler. Aucun effet indésirable n'est attendu si Caphosol est avalé accidentellement.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable ou en cas d'incident, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière/ère. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables ou les incidents directement au fabricant par e-mail à RRDpharmacovigilance@recordati.com ou à l'autorité de santé nationale. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du dispositif médical.

DE

1 Packung enthält 32 Anwendungen
1 Anwendung = 2 einmalige Behältnisse zu je 15 ml

- Arzneimittelform: Mundspülung, Wässrige Lösung. Caphosol ist eine Zubereitung, die aus zwei getrennt verpackten wässrigen Lösungen besteht: einer Phosphatlösung (Caphosol A) und einer Calciumlösung (Caphosol B), die bei Mischung der beiden Lösungen in gleichen Volumina sowohl in Hinblick auf Calcium- als auch Phosphationen eine übersättigte Lösung bildet.
- Bestandteile: Dinatriumhydrogenphosphat 0,052, Natriumdihydrogenphosphat 0,000, Calciumchlorid 0,052, Natriumchlorid 0,269, gereinigtes Wasser q.s. (Gew.-%)
- Wirkungen: Caphosol ist eine Elektrolytlösung, die dazu dient, die Mundhöhle einschließlich der Mund-, Zungen- und Rachenschleimhaut zu befeuchten, einzuölen und zu reinigen.
- Anwendungsgebiete: Caphosol wird bei Trockenheit in Mund und Rachen (Hypposalivation, Xerostomie) angewendet, Ursache oder Dauer des Zustandes (vorübergehend oder dauerhaft) spielen dabei keine Rolle. Caphosol wird zudem als Zusatz zur Standardmundpflege bei der Vorbeugung und Behandlung von Mukositis eingesetzt, die durch eine Strahlen- oder Hochdosis-Chemotherapie verursacht worden sein kann. Die Linderung der trockenen Mundschleimhaut ist bei diesen Erkrankungen mit einer Linderung der Schmerzen verbunden.
- Gebrauchsanleitung:
  (1+2) Füllt Caphosol A, mit Caphosol B, in einem sauberen Glas miteinander vermischen.
  (3) Den Mund 1 min lang gründlich mit der Hälfte der Lösung spülen und dann die Lösung ausspucken.
  (3) Vorgang mit der anderen Hälfte der Lösung wiederholen und dann die Lösung ausspucken. Unmittelbar nach dem Mischen der Einzelposen verwenden.
- Dosierung: 4 bis 10 Mal täglich. Für die Dauer der Behandlung oder gemäß ärztlicher Anweisung verwenden.
- Wechselwirkungen mit anderen Behandlungen : Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Produkten bekannt.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Mindestens 15 Minuten nach Gebrauch nicht essen oder trinken. Nicht verwenden, wenn das Siegel des Einzeldosisbehälters aufgebrochen wurde oder der Einzeldosisbehälter Zeichen auf ein Leck oder Schäden aufweist. Enthält Natrium (71 mg pro 30 ml Dosis). Patienten, die eine natriumarme Diät einhalten, sollten vor Gebrauch Ihren Arzt aufsuchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht injizieren. Nicht einfrieren. Bei versehentlicher Einnahme von Caphosol sind keine unerwünschten Wirkungen zu erwarten.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen oder unerwünschte Vorkommnisse bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Sie können Nebenwirkungen oder unerwünschte Vorkommnisse auch direkt dem Hersteller melden, und zwar per E-Mail an RRDpharmacovigilance@recordati.com, oder Ihrer örtlichen Gesundheitsbehörde. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinprodukts zur Verfügung gestellt werden.

ES

1 caja contiene 32 dosis
1 dosis = 2 envases unidosis, cada uno de 15 ml, mezclados

- Forma farmacéutica : Enjuague bucal, Solución acuosa. Caphosol es una preparación que contiene dos soluciones acuosas envasadas por separado, una solución de fosfato (Caphosol A) y una solución de calcio (Caphosol B) las cuales, cuando se combinan en volúmenes iguales, forman una solución sobresaturada respecto de iones de calcio y de fosfato.
- Componentes : Fosfato de sodio dibásico al 0,052, Fosfato de sodio monobásico al 0,000, Cloruro de calcio al 0,052, Cloruro de sodio al 0,269, Agua purificada c.s. (%p/p)
- Acciones : Caphosol es una solución electrolítica conçue para humedecer, lubricar y limpiar la cavidad oral, incluyendo la mucosa de la boca, lengua y orofaringe.
- Indicaciones : Caphosol está indicado para la sequedad de boca y orofaringe (hipposialorrea, xerostomía), sea importar la causa si es el tratamiento sea temporal o permanente. Caphosol está también indicado como un adyuvante al cuidado oral estándar en la prevención y el tratamiento de la mucositis que puede estar causada por radiación o quimioterapia a alta dosis. El alivio de la sequedad de la mucosa oral en estos casos está asociado con una mejoría del dolor.
- Modo de uso:
  (1+2) Mezclar 1 unidosis Caphosol A con un unidosis Caphosol B en un vaso limpio.
  (3) Enjuagar la boca profundamente durante 1 minuto con la mitad de la solución y escupir.
  (3) Repetir con la otra mitad de la solución y escupir. Utilizar inmediatamente después de mezclar los envases unidosis.
- Dosis: De 4 a 10 veces al día. Utilizar hasta finalizar el tratamiento, o según las instrucciones de su médico.
- Interacciones con otros tratamientos : No se conocen interacciones con medicamentos u otro tipo de productos.
- Precauciones especiales de uso : Evite comer o beber durante al menos 15 minutos después de utilizar el enjuague. No utilice si el sello del envase unidosis está roto, o si el envase unidosis muestra señales de fuga o está dañado.
  Contiene sodio (71 mg por dosis de 30 ml). Los pacientes que sigan una dieta baja en sodio deberán consultar con su médico antes de usar este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No inyectar. No congelar. No se prevén efectos adversos si accidentalmente se ingiere Caphosol.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta efectos adversos o incidentes adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. Puede también notificar los efectos adversos o incidentes adversos directamente al fabricante mediante correo electrónico a RRDpharmacovigilance@recordati.com o a su autoridad sanitaria local. Al notificar los efectos adversos, puede ayudar a aportar más información sobre la seguridad de este producto sanitario.

PT

1 caixa contém 32 doses de tratamento
1 dose de tratamento = 2 recipientes unidose, cada um com 15 ml, misturados

- Forma Farmacêutica : Solução oral. Solução aquosa. Caphosol é uma preparação que inclui duas soluções aquosas, embaladas separadamente: uma solução de fosfato (Caphosol A) e uma solução de cálcio (Caphosol B) que, quando combinadas em volumes iguais, formam uma solução sobressaturada relativamente aos iões cálcio e fosfato.
- Ingredientes : 0,052 de Fosfato Sódico Dibásico, 0,000 de Fosfato Sódico Monobásico, 0,052 de Cloreto de Cálcio, 0,269 de Cloreto de Sódio, Água purificada q.s. (%p/p)
- Acções : Caphosol é uma solução electrolítica destinada a humedecer, lubrificar e limpar a cavidade oral, incluindo a mucosa da boca, língua e orofaringe.
- Indicações : Caphosol está indicado para a secura da boca e da orofaringe (hipossialorreia, xerostomia), independentemente da causa e do facto da condição ser temporária ou permanente. Caphosol também está indicado como adjuvante para o tratamento e/ou profilaxia na prevenção e tratamento da mucosite que pode ser causada por radiação ou uma elevada dose de quimioterapia. O alívio da secura da mucosa oral, nestas condições, está associado a melhoria da dor.
- Instruções de utilização :
  (1+2) Misturar 1 recipiente unidose Caphosol A e 1 recipiente unidose Caphosol B num copo limpo.
  (3) Bochechar cuidadosamente a boca durante 1 minuto com metade da solução e cuspir.
  (3) Repetir com a restante solução e cuspir. Usar imediatamente após a mistura dos recipientes unidose.
- Posología : 4 a 10 vezes ao dia. Utilizar durante o período de tratamento ou segundo as indicações do médico.
- Interacções com medicamentos : Não há interacções conhecidas com medicamentos ou com outros produtos.
- Precauções especiais de utilização : Evitar comer ou beber nos 15 minutos seguintes à sua utilização. Não usar, se o selo do recipiente unidose estiver quebrado ou se o recipiente unidose evidenciar sinais de fuga ou danos. Contém sódio (71 mg por dose de tratamento de 30 ml). Os doentes, limitados a uma dieta com baixo teor de sódio, devem consultar o seu médico antes da utilização. Manter fora do alcance das crianças. Não injectar. Não congelar. Não se prevêem efeitos adversos, se engolir acidentalmente Caphosol.

Comunicação de efeitos secundários
Se tiver quaisquer efeitos secundários ou incidentes adversos, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos secundários ou incidentes adversos diretamente ao fabricante através de email RRDpharmacovigilance@recordati.com ou às autoridades de saúde locais. Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste dispositivo médico.

GR

1 μπουκάλι περιέχει 32 δοσολογίες θεραπείας
1 δόση = 2 φιαλιδάκια μονοδοσίας, καθένα με 15 ml, μεταξύ τους ίσοι

- Φαρμακευτική μορφή : Διάλυμα για στοματικές πλύσεις. Υδατικό διάλυμα. Το Caphosol είναι ένα παρασκεύασμα που αποτελείται από δύο υδατικές διαλύσεις συσκευασμένες ξεχωριστά, ένα διάλυμα φωσφορικού (Caphosol A) και ένα διάλυμα ασβεστίου (Caphosol B) το οποίο, στην αναλογία ίσων ογκομετρικών μερών, σχηματίζουν ένα υπερκορεσμένο σε ιόντα ασβεστίου και φωσφορικά διάλυμα.
- Συστατικά : Διβασικό Φωσφορικό Νάτριο 0,052, Μονοβασικό Φωσφορικό Νάτριο 0,000, Χλωριούχο Ασβέστιο 0,052, Χλωριούχο Νάτριο 0,269, Κεκαθαρμένο νέρο ποσ. ποσότητας (%.κ.β.)
- Δράσεις : Το Caphosol είναι ένα διάλυμα ηλεκτρολυτών σχεδιασμένο για την ενυδάτωση, τη λίπανση και τον καθαρισμό της στοματικής κοιλότητας, συμπεριλαμβανομένου και του βλεννογόνου του στόματος, της γλώσσας και του στοματοφάρυγγα.
- Ενδείξεις : Το Caphosol ενδείκνυται για τη ξηρότητα του στόματος και του στοματοφάρυγγα (στοματικός ξηροστομία), ανεξαρτήτως της αιτίας και του εάν η κατάσταση είναι προσωρινή ή μόνιμη. Το Caphosol ενδείκνυται επίσης ως συμπληρωματικό της συνήθους φροντίδας του στόματος για την πρόληψη και τη θεραπεία της βλεννογόνιτιδας η οποία μπορεί να προκληθεί από ο του ακτινοβολία ή την χημειοθεραπεία υψηλής δόσης. Η ανακούφιση της ξηρότητας του βλεννογόνου του στόματος σε αυτές τις περίπτωσεις συνδέεται με μειωμένο πόνο.
- Οδηγίες χρήσης :
  (1+2) Ανοίγετε 1 Caphosol A και 1 Caphosol B σε ένα καθαρό ποτήρι.
  (3) Πλύνετε το στόμα καλά για 1 λεπτό με το 1/2 του διαλύματος και φτύστε το.
  (3) Επαναλάβετε με το υπολειπόμενο 1/2 του διαλύματος και φτύστε το. Χρησιμοποιήστε το αμέσως μετά τον μίγμα των παρασκευών μίας δόσης.
- Δοσολογία : 4 έως και 10 φορές την ημέρα. Χρησιμοποιήστε το κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
- Αλληλεπιδράσεις με άλλες θεραπευτικές ουσίες : Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικά ή άλλα προϊόντα.
- Ειδικές προφυλάξεις κατά την χρήση : Αποφύγετε την κατανάλωση τροφών ή ποτών για τουλάχιστον 15 λεπτά μετά την χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η σφραγίδα του πώματος μιας δόσης είναι σπασμένη ή σε περίπτωση που ο περιέκτης μιας δόσης εμφανίζει σημάδι διαρροής ή φθοράς. Περιέχει νάτριο (71 mg ανά 30 ml δόση θεραπείας). Οι ασθενείς οι οποίοι ακολουθούν μια δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας νατρίου πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους πριν από την χρήση. Κρατήστε σε σημείο που δεν μπορούν να το φτάσουν τα παιδιά. Μη χρησιμοποιείτε. Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες σε περίπτωση σκόπιμης κατάποσης του Caphosol.

Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών
Εάν εμφανίσετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή ανεπιθύμητα συμβάντα, μιλήστε με τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή ανεπιθύμητα συμβάντα απευθείας στον κατασκευαστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύνση RRDpharmacovigilance@recordati.com ή στις τοπικές σας υγειονομικές αρχές. Αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορείτε να βοηθήσετε στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια αυτής της ιατρικής συσκευής.

HR

1 pakiranje sadrži 32 tretmanske
1 tretman = 2 spremnika jednokratne uporabe, svaki od 15 ml, miješati zajedno

- Farmaceutski oblik: Otopina za ispiranje usta, Vodena otopina. Caphosol je pripravak koji se sastoji od dvije vodene otopine u zasebnim spremnicima, otopine fosfata (Caphosol A) i otopine kalcija (Caphosol B) koje, kada se kombiniraju u jednakim volumenima, tvore prezasićenu otopinu kalcijevih i fosfatnih iona.
- Sastojci: Dinatrijev hidrogenfosfat 0,052, Natrijev dihidrogenfosfat 0,000, Kalcijev klorid 0,052, Natrijev klorid 0,269, Pročišćena voda q.s. (%m/m)
- Djelovanje: Caphosol je elektrolitna otopina dizajnirana za vlaženje, podmazivanje i čišćenje usne šupljine, uključujući sluznicu usta, jezika i ždrijela.
- Indikacije: Caphosol je indiciran kod suhoće usta i ždrijela (hipsalivacija, kserostomija), neovisno o uzroku i bilo da je stanje prolazno ili trajno. Caphosol je indiciran i kao dodatak standardnoj njezi usta u prevenciji i liječenju mukozitisa koji se može pojaviti kao posljedica zračenja ili visokodozne kemoterapije. Ublažavanje suhoće sluznice usta u navedenim slučajevima povezano je s ublažavanjem bolova.
- Upute za primjenu:
  (1+2) Sipati 2 jednokratne doze Caphosol A i 1 jednokratnu dozu Caphosol B u čistu čašu.
  (3) Temeljito ispljuskati usta 1 minutu s polovicom otopine i ispljunuti.
  (3) Ponoviti s preostalom polovicom otopine i ispljunuti. Upotrijebite neposredno nakon miješanja jednokratnih doza.
- Doziranje: 4 do 10 puta na dan. Koristite za vrijeme trajanja liječenja ili prema uputama liječnika.
- Interakcije s drugim lijekovima: Nije poznata nikakva interakcija s drugim lijekovima.
- Posebne mjere opreza pri primjeni: Izbjegavajte jelo i piće najmanje 15 minuta nakon primjene. Ne koristite ako je jedinični spremnik oštećen ili ako jedinični spremnik pokazuje znakove curenja ili oštećenja. Sadrži natrij (71 mg po dozi od 30 ml). Pacijenti na dijeti s niskim sadržajem natrija trebaju se prije primjene obratiti svojem liječniku. Čuvati izvan dohvata djece. Ne injektirati. Ne smrzavati. Ako se Caphosol slučajno ili namjerno ili nehotice ili nesvjesno ili nesvjesno ili nesvjesno

Caphosol

mukosit sem kan vara förknippat av strålbehandling eller hoop doser med cytogift. Vid dessa tillstånden vill en bedöma av medicinskt personal om fortsatt vara behandlad med strålbehandling.

- Bruksanvisning

(1+2) Blandat 1 Caphosol A og 1 endosebehållare Caphosol B i et rent glas.
(3) Skyll munnen grundig i min, med halvparten av løsningen og spytt ut.
(3) Gjenta med den andre endosebehållaren av løsningen og spytt ut.

- Brukes umiddelbart etter blanding av endosebehållerne.
- Dosering: 4 til 10 ganger om dagen. Brukes under behandlingen varighet eller eller lepers ansikning.
- Interaksjoner med andre behandlinger: Det er ingen kjente interaksjoner med legemidler eller andre produkter.
- Spesielle forholdsregler for bruk: Unngå å spise og drikke i minst 15 minutter etter bruk. Bruk ikke mer endosebehållerne forsegling er brøt eller hele endosebehållerne viser tegn på lekkasje eller skade. Inneholder natrium (77 mg per 30 ml dose). Pasienter på en natriumfattig diett bør oldere seg med legen om dette.Oppbevares utilgjengelig for barn. Mot ikke injisere. Mot ikke hjelpe. Det inneholdes ingen bestandeler denne Caphosol vet et skadelig antigen.

Midtjog av strålenger

Kontakt legen, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger eller uønskede hendelser. Du kan også melde fra om bivirkninger eller uønskede hendelser direkte til produsenten via e-post til RRDpharmacovigilance@recordati.com, eller til et lokale helsemyndigheten, med henvisning til den tilhørende batteri av det med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette medisinske stoffet.

SK

1 balička obsahuje 30 liekových dávok

1 fľaštiek obsahuje 2 jednodávkové vonkajšie kontejnery obsahujúce 15 ml, sterilného roztoku

- Liekové formy: Roztok k vyplachu ústnej dutiny. Vodný roztok. Caphosol je pripravok určený na dočasnú samoaktivitu liekových endných mediciín, roztok fosfátu (Caphosol A) a roztok kalcia (Caphosol B). Smrtelnému obsahujú kontakt s ústnym obsahu zdravé stále ešte temporal sau permanent). Caphosol dopis rolnot do zoznamoca a adjuvant in hygiena ostatní ústnej dutiny prevenirea si tratamentul mucosei orale care poate provocate de radioactivitate sau de doze ridicate de chemoterapie, în același timp, în timpul în care este de ucide a mucosei bucale este ancorată cu emoțiunea durere.
- Instrucțiuni de utilizare

(1+2) Amestecați o fiolă Caphosol A și un recipient unidoză Caphosol B într-un pahar curat.
(3) Clătiți bucăl gura timp de 1 minut cu jumătate din soluție și scuipați.
(3) Repetați cu jumătatea de soluție rămasă și scuipați.

- A se utilize imediat după amestecarea recipientilor unidoză.
- Dozare: De 4 până la 10 ori pe zi. A se utilize pe durata tratamentului sau ori câte ori va prescrie medicul.
- Interacțiuni cu alte tratamente: Nu sunt cunoscute produse medicamentoase care de afș notată.
- Precauții speciale de utilizare: Evitați să mâncați sau să beți timp de cel puțin 15 minute după utilizare. A nu se utilize dacă sigilul este spărtat și unidoza pe care este de scoș este vizibil de deteriorare. Conține sodiu (77 mg la un tratament dozat de 30 ml). Pacienții care urmează o dietă cu conținut redus de sodiu trebuie să ții cont de aceasta atunci de utilizare. A nu se păstra la îndemâna copiilor. A nu se ingera. A nu se conjuga. Nu sunt antibiotice efecte adverse dacă folosiți Caphosol.

Sfârșitul tratamentului

Contactați medicul sau farmacistul dvs. în caz de apariție a oricărei reacții adverse care nu este menționată în prezentul prospect. Puteți, de asemenea, trimite reacții adverse prin intermediul unui cadru de raportare la adresa de e-mail RRDpharmacovigilance@recordati.com, sau autorității naționale de sănătate, în contextul solicitării. Raportând reacții adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui dispozitiv medical.

LT

Pakuotė su 1 vienkartinio naudojimo 2 nedaužomosios dėžės, kurioje yra 15 ml, sterilaus tirpalo

- Vaistinės formos: Burnos ertmės skalojamas tirpalas. Vandeninis tirpalas. Caphosol yra pirmasis, kuri sudaro du atskiros sąsajos vandeninės tirpalai: fosfatinis (Caphosol A) ir natrio tirpalas (Caphosol B), kuriuos sudaro kalcio. Kai jie sumaišomi, vandeninės sąlygos sudaro kietą gelį, kuris ant burnos ertmės sukuria apsauginę membraną, kuri yra pritvirtinta prie gleivinės ir kuri yra atsakinga už skausmą. Ši membrana sumažina skausmą ir apsaugo nuo tolesnės žalos, kurią gali sukelti radioterapija ir chemoterapija, kai ji veikia gleivinės ląstelės. Ši membrana taip pat užtikrina, kad gleivinės ląstelės gali atsigauti, kol ji yra pritvirtinta prie gleivinės.
- Naudojimo būdas

(1+2) Vienas Caphosol A ir 1 Caphosol B buteliukas išpilstyti į stiklinę.
(3) Kamšalo sąlytis burnoje ir išmaišyti jo **antilinę vilną**.
(3) Kamšalo sąlytis burnoje ir išmaišyti jo **antilinę vilną**.

- Kasdienė vartojimo dozė: Vienas buteliukas ne mažesnis kaip 4 kartus per dienę ir ne daugiau kaip 10 kartų per dieną.
- Antimikrobinė: 4 kartai 10 kartų per dieną.
- Kasdienė naudojimo trukmė: Kasdienė naudojimo trukmė priklausys nuo jo poreikio.
- Kontraindikacijos: Nėra žinomos kontraindikacijos.
- Ypatingos atsargumo priemonės vartojant: Vaistinės medžiagos sąveikos su kitais vaistais ir kitomis medžiagomis nėra žinoma. Nuo to, ką jis yra, jis yra. Nuo to, ko jis yra, jis yra. Nuo to, ko jis yra, jis yra. Nuo to, ko