

10 globulek dopochwowych,
globulka 2 g

CANDITON® HA

Globulki dopochwowe

SKŁAD: Jedna globulka zawiera: kwas borny, sól sodową kwasu hialuronowego, polikarbofil, kwas mlekowy, octan tokoferolu, witaminę A, kwas 18-beta-glicyretynowy, olejek z drzewa herbacianego, półsyntetyczne triglicerydy, fosfatydylocholinę.

OPIS: Globulki Canditon® HA to wyrób medyczny, który pomaga utrzymać naturalne mechanizmy obronne pochwy i przyspiesza odbudowę prawidłowej flory pochwy; zawartość kwasu hialuronowego, kwasu bornego i kwasu mlekowego pomaga w usunięciu objawów związanych z brakiem równowagi w uwodnieniu pochwy i/lub nieprawidłowym pH pochwy.

Kwas hialuronowy w postaci soli sodowej w dawce 10 mg/globulkę działa nawilżająco i natłuszczaająco w przypadku suchości pochwy, przyczyniając się do przywrócenia naturalnego i optymalnego środowiska w pochwie.

Kwas mlekowy normalnie obecny w pochwie sprzyja natychmiastowemu skorygowaniu pH i ułatwia naturalną odbudowę delikatnego ekosystemu sromu i pochwy.

Kwas borny, dzięki trwałości w środowisku pochwy, sprzyja długotrwałemu obniżeniu pH.

WSKAZANIA: Wyrób jest przydatny w zapobieganiu i leczeniu suchości pochwy, także o charakterze grzybiczym. Łagodzi podrażnienia, pieczenie i świąd.

DAWKOWANIE: Wprowadzać do pochwy 1 globulkę dziennie - najlepiej wieczorem przed snem - przez 5-7 dni po zakończeniu cyklu miesiączkowego lub według zaleceń lekarza.

SPOSÓB UŻYCIA:

- 1) Dokładnie umyć pochwę (najlepiej płynem do higieny intymnej, wewnątrz i na zewnątrz).
- 2) Otworzyć opakowanie i po dokładnym umyciu rąk wyjąć jedną globulkę z blistrza.
- 3) Delikatnie wprowadzić globulkę głęboko do pochwy, najlepiej w pozycji leżącej na plecach, aby nie dopuścić do niezamierzonego wysunięcia się globulki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA: Opakowanie należy przechowywać prawidłowo zamknięte w suchym miejscu, w temperaturze od 5°C do 25°C, z dala od źródeł światła i ciepła.

DZIAŁANIA UBOCZNE: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

OSTRZEŻENIA: Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie polykać. Nie stosować, jeśli opakowanie zostało wcześniej otwarte lub jest uszkodzone. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności. Data ważności odnosi się do nieotwartego i prawidłowo przechowywanego produktu. Nie stosować produktu w przypadku występowania zmian i ran w pochwie. Nie stosować produktu w trakcie krwawienia miesięcznego. Nie należy przekraczać sugerowanej dawki bez konsultacji z lekarzem. Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, może prowadzić do wystąpienia objawów uczuleniowych. Należy wówczas przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem w celu rozpoczęcia odpowiedniej terapii. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich objawach niepożądanych, które nie zostały opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Nie należy stosować produktu dłużej niż przez 30 kolejnych dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: W okresie ciąży, laktacji i u dzieci wybór może być stosowany tylko, jeśli jest to zdecydowanie konieczne i pod bezpośrednią kontrolą lekarza. W przypadku nienaruszonej błony dziewiczej przed użyciem należy skonsultować się z ginekologiem w celu ustalenia szczegółowych warunków stosowania. Wyrób jednorazowego użytku. W przypadku wydostania się globulki z pochwy nie należy stosować jej ponownie.

OPAKOWANIE: Pudełko z dwoma blistrami zawierające 10 globulek dopochwowych 2 g/globulkę.

Data zatwierdzenia: 10.2021



Wytwórca:
Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro,
1 - 25124 Brescia, Włochy

Dystrybutor w Polsce:
Hexanova Sp. z o.o.
Brukowa 36,
05-092 Łomianki

Wyrobu medycznego nie wolno wyrzucać do ścieków lub wraz z odpadami domowymi. Zapytaj farmaceutę o sposób usuwania niepotrzebnych wyrobów medycznych.
Pomoże to chronić środowisko naturalne.

LFT_CAND_HA_10.2021

