

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Hascoderm
200 mg/g, krem

Acidum azelaicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Hascoderm i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascoderm
3. Jak stosować lek Hascoderm
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Hascoderm
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Hascoderm i w jakim celu się go stosuje

Hascoderm jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci kremu do stosowania na skórę, zawierający substancję czynną kwas azelainowy. Hamuje rozwój bakterii *Propionibacterium acnes* przyczyniających się do powstawania trądziku pospolitego, wpływa na proces rogowacenia naskórka, hamuje powstawanie zaskórników oraz powoduje zmniejszenie ilości kwasów tłuszczowych na skórze.

Ponadto Hascoderm w postaci kremu hamuje wzrost i nadmierną aktywność nieprawidłowych komórek barwnikowych (melanocytów).

Wskazania do stosowania

- trądzik pospolity,
- przebarwienia skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascoderm

Kiedy nie stosować leku Hascoderm:

- jeśli pacjent ma uczulenie na kwas azelainowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascoderm należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi.

W przypadku dostania się leku do oka, należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.
W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, należy skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Hascoderm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ogranicza sprawności psychofizycznej oraz nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Hascoderm zawiera kwas benzoesowy, glikol propylenowy

Lek może powodować podrażnienie skóry, oczu i błon śluzowych.

Hascoderm zawiera alkohol cetostearylowy

Lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Hascoderm

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować wyłącznie na skórę.

Hascoderm w postaci kremu stosuje się najczęściej 2 razy na dobę – rano i wieczorem. Cienką warstwę leku należy wklepać w zmienioną chorobowo powierzchnię skóry, uprzednio dokładnie umytą i osuszoną. Pasek o długości około 2,5 cm całkowicie wystarcza na pokrycie skóry twarzy. Po nałożeniu leku należy umyć ręce.

W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, należy zmniejszyć ilość nakładanego leku lub stosować go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli nadal utrzymują się objawy podrażnienia skóry, należy czasowo przerwać leczenie.

Okres leczenia zależy od nasilenia zmian chorobowych.

W leczeniu trądziku pospolitego znaczącą poprawę uzyskuje się po 4 tygodniach systematycznego stosowania leku. Aby uzyskać optymalny wynik leczenia należy stosować lek nieprzerwanie przez kilka miesięcy, lecz nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

W leczeniu przebarwień skóry zaleca się stosowanie co najmniej przez 3 miesiące. Najlepszy rezultat osiąga się stosując lek systematycznie. Ponieważ promieniowanie słoneczne może nasilać przebarwienia skóry, podczas całego okresu leczenia należy jednocześnie stosować kremy z filtrem UV B i UV A.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Hascoderm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy te są przemijające, ustępują zwykle w trakcie leczenia.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- zapalenie skóry;
- zapalenie mieszków włosowych.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

- reakcje nadwrażliwości na światło;
- alergiczne reakcje skórne.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaczerwienienie;
- świąd;
- pieczenie;
- suchość skóry i złuszczenie naskórka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 - 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Hascoderm

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascoderm

- Substancją czynną leku jest kwas azelainowy. 1 g kremu zawiera 200 mg kwasu azelainowego.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: alkohol cetostearylowy, simulsol 165, simulsol M49, glicerolu monostearnian SE, izopropylu mirystynian, lanol 1688, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, polisorbat 20, kwas benzoesowy, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascoderm i co zawiera opakowanie

Jedno opakowanie zawiera 30 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: