

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Lansoprazole Genoptim 15 mg, kapsułki dojelitowe, twarde
Lansoprazole Genoptim 30 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Lansoprazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Lansoprazole Genoptim i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lansoprazole Genoptim
3. Jak przyjmować lek Lansoprazole Genoptim
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Lansoprazole Genoptim
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Lansoprazole Genoptim i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Lansoprazole Genoptim jest lansoprazol, który jest inhibitorem pompy protonowej. Inhibitory pompy protonowej zmniejszają ilość kwasu wydzielanego w żołądku.

Lekarz może przepisać lek Lansoprazole Genoptim w następujących wskazaniach:

- leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka
- leczenie zapalenia przełyku (refluksowe zapalenie przełyku)
- zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku
- leczenie zgagi i zarzucania kwasu żołądkowego do przełyku
- leczenie zakażenia spowodowanego przez bakterie *Helicobacter pylori*, w połączeniu z antybiotykami
- leczenie lub zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy lub żołądka u pacjentów wymagających stałego leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (NLPZ stosowane są w leczeniu bólu lub stanów zapalnych)
- leczenie zespołu Zollingera i Ellisona.

Lekarz może również przepisać lek Lansoprazole Genoptim w innym wskazaniu oraz w innej dawce niż te, które zostały wymienione w ulotce. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza podczas przyjmowania leku.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Lansoprazole Genoptim

Kiedy nie przyjmować leku Lansoprazole Genoptim:

- jeśli pacjent ma uczulenie na lansoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent stosuje lek zawierający substancję czynną atazanawir (stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi o ciężkiej chorobie wątroby. Lekarz może wówczas dostosować dawkowanie.

Lekarz może wykonać lub wykonał dodatkowe badanie (tzw. endoskopię) w celu rozpoznania choroby pacjenta i (lub) wykluczenia nowotworu złośliwego.

Jeżeli w trakcie leczenia lekiem Lansoprazole Genoptim wystąpi biegunka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ stosowanie leku Lansoprazole Genoptim związane jest z niewielkim zwiększeniem ryzyka biegunek zakaźnych.

Jeżeli lekarz przepisał pacjentowi lek Lansoprazole Genoptim w połączeniu z innymi lekami (antybiotykami) stosowanymi w leczeniu zakażenia *Helicobacter pylori* lub razem z lekami przeciwwzapalnymi stosowanymi w leczeniu bólu lub choroby reumatycznej, należy również zapoznać się uważnie z treścią ulotek tych leków.

Jeżeli pacjent stosuje lek Lansoprazole Genoptim przez długi okres (dłużej niż rok), prawdopodobnie lekarz będzie regularnie kontrolować stan pacjenta. Podczas każdej wizyty u lekarza należy zgłaszać ewentualne nowe i wyjątkowe objawy oraz okoliczności ich występowania.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lansoprazole Genoptim należy skonsultować się z lekarzem:

- jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku podobnego do leku Lansoprazole Genoptim, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.

Przed przyjęciem leku należy poinformować lekarza o planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromograniny A).

Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ konieczne może być przerwanie stosowania leku Lansoprazole Genoptim. Należy również powiedzieć o wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.

Lek Lansoprazole Genoptim a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków zawierających następujące substancje czynne, ponieważ lek Lansoprazole Genoptim może zaburzać ich działanie:

- ketokonazol, itrakonazol, ryfampicyna (leki stosowane w leczeniu zakażeń)
- digoksyna (lek stosowany w leczeniu chorób serca)
- teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy)
- takrolimus (lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu)
- fluwoksamina (lek stosowany w leczeniu depresji i innych chorób psychicznych)
- leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w leczeniu zgagi lub cofania się kwasu żołądkowego do przełyku)
- sukralfat (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń)

- dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*) (lek stosowany w leczeniu łagodnej depresji)

Lansoprazole Genoptim z jedzeniem, pić i alkoholem

Aby uzyskać najlepsze wyniki leczenia, lek Lansoprazole Genoptim należy przyjmować co najmniej 30 minut przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Lansoprazole Genoptim w czasie ciąży nie jest zalecane, ponieważ nie ma odpowiedniego doświadczenia w kwestii stosowania lansoprazolu w ciąży.

Nie ma wystarczającego doświadczenia w kwestii stosowania leku w okresie karmienia piersią. Na podstawie wyników badań na zwierzętach uważa się, że lansoprazol przenika do mleka kobiecego. Podejmując decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią, bądź kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia lekiem Lansoprazole Genoptim, należy rozważyć korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania leku Lansoprazole Genoptim dla matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

U pacjentów przyjmujących lek Lansoprazole Genoptim mogą występować działania niepożądane takie jak: zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpią takie działania niepożądane, pacjent powinien zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia pogorszenia zdolności reagowania.

Pacjent sam jest odpowiedzialny za decyzję, czy jego stan pozwala na prowadzenie pojazdów lub wykonywanie innych czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji. Jednym z czynników, który może zmniejszać zdolność bezpiecznego wykonywania tych czynności jest stosowanie przez pacjenta leków, z powodu ich działania lub wystąpienia działań niepożądanych.

Opisy tych działań znajdują się w innych częściach ulotki.

Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ulotce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Lek Lansoprazole Genoptim zawiera sacharozę

Lansoprazole Genoptim zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Lansoprazole Genoptim

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Odrywalne blistry otwiera się według poniższej instrukcji po otwarciu folii:

- Oderwać jeden blister poprzez zerwanie perforacji
- Ostrożnie oderwać brzeg folii, odsłaniając kapsułkę

(KAPSUŁKI NIE WOLNO WYCISKAĆ PRZEZ FOLIĘ)



Nieodrywalne blistry otwiera się poprzez wyciśnięcie kapsułki przez aluminiową folię

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Nie należy kruszyć ani żuć kapsułek lub ich zawartości, ponieważ wpłynie to na prawidłowe działanie leku.

W przypadku stosowania leku Lansoprazole Genoptim raz na dobę, zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia. Najlepsze wyniki leczenia można osiągnąć, jeśli lek Lansoprazole Genoptim jest przyjmowany rano, przed śniadaniem.

W przypadku stosowania leku Lansoprazole Genoptim dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć rano, a drugą dawkę wieczorem.

Dawka leku Lansoprazole Genoptim zależy od stanu pacjenta. Poniżej przedstawiono zazwyczaj stosowane dawki leku Lansoprazole Genoptim u dorosłych. Lekarz może niekiedy przepisać inną dawkę i poinformuje pacjenta o czasie trwania leczenia.

Leczenie zgagi i cofania się kwasu żołądkowego do przełyku: 1 kapsułka 15 mg lub 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie. Jeśli objawy utrzymują się, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Jeżeli po 4 tygodniach leczenia objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy: 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 2 tygodnie

Leczenie choroby wrzodowej żołądka: 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie

Leczenie zapalenia przełyku (refluksowe zapalenie przełyku): 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie

Długotrwałe zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku: 1 kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 30 mg raz na dobę.

Leczenie zakażenia *Helicobacter pylori*: Zazwyczaj stosuje się 1 kapsułkę 30 mg w połączeniu z 2 różnymi antybiotykami rano oraz 1 kapsułkę 30 mg w połączeniu z 2 różnymi antybiotykami wieczorem. Zazwyczaj leczenie trwa 7 dni.

Zalecane jest stosowanie następujących połączeń antybiotyków:

- 30 mg leku Lansoprazole Genoptim łącznie z 250–500 mg klarytromycyny i 1000 mg amoksyliny
- 30 mg Lansoprazole Genoptim łącznie z 250 mg klarytromycyny i 400–500 mg metronidazolu

W przypadku leczenia u pacjenta zakażenia, związanego z chorobą wrzodową, nawrót choroby wrzodowej jest mało prawdopodobny, jeśli zakażenie zostanie całkowicie wyleczone. Aby zapewnić możliwość najlepszego działania leku, należy przyjmować go o odpowiedniej porze i **nie należy pomijać żadnej dawki.**

Leczenie choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ: 1 kapsułka 30 mg raz na dobę przez 4 tygodnie.

Zapobieganie chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy u pacjentów wymagających stałego leczenia NLPZ: 1 kapsułka 15 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 1 kapsułki 30 mg raz na dobę.

Zespół Zollingera i Ellisona: Zwykła dawka początkowa to 2 kapsułki 30 mg na dobę, następnie, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie lekiem Lansoprazole Genoptim, lekarz zdecyduje o dalszym dawkowaniu odpowiednim dla danego pacjenta.

Lek Lansoprazole Genoptim nie powinien być stosowany u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Lansoprazole Genoptim

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Lansoprazole Genoptim należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Lekarz może skontaktować się z centrum informacji toksykologicznej.

Pominięcie przyjęcia leku Lansoprazole Genoptim

Jeżeli pacjent zapomni zażyć lek, powinien go przyjąć tak szybko jak to możliwe, jeśli nie zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki. Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, pacjent powinien pominąć dawkę, o której zapomniał. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lansoprazole Genoptim

Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli stan pacjenta się poprawił. Choroba mogła nie zostać całkowicie wyleczona i może wystąpić jej nawrót, jeśli leczenie zostanie przerwane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

- ból głowy, zawroty głowy
- biegunka, zaparcia, bóle brzucha, nudności lub wymioty, oddawanie gazów, suchość lub ból jamy ustnej lub gardła
- wysypka skórna, świąd skóry
- zmiana wyników badań czynności wątroby
- zmęczenie
- łagodne polipy żołądka.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

- depresja
- ból stawów lub mięśni
- zatrzymanie płynów w organizmie lub obrzęki
- zmiana liczby krwinek.

Rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

- gorączka
- niepokój, senność, splątanie, omamy, bezsenność, zaburzenia widzenia, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego
- zaburzenia smaku, utrata apetytu, zapalenie języka
- reakcje skórne, takie jak uczucie pieczenia lub klucia pod skórą, tworzenie się siniaków, zaczerwienienie oraz nadmierna potliwość
- nadwrażliwość na światło
- wypadanie włosów
- uczucie drętwienia (parestezje), drżenia

- niedokrwistość (bładość)
- zaburzenia nerek
- zapalenie trzustki
- zapalenie wątroby (które może objawiać się zażółceniem skóry lub białkówki oczu)
- obrzęk piersi u mężczyzn, impotencja
- kandydoza (zakażenie grzybicze mogące pojawiać się na skórze lub błonach śluzowych)
- obrzęk naczynioruchowy; pacjent powinien **natychmiast skontaktować się z lekarzem** w przypadku wystąpienia objawów obrzęku naczynioruchowego takich, jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przelknięciu, pokrzywka i trudności w oddychaniu;
- stosowanie inhibitorów pompy protonowej, takich jak Lansoprazole Genoptim, zwłaszcza przez ponad rok, może nieznacznie zwiększać ryzyko złamania w okolicy stawu biodrowego, nadgarstka lub kręgosłupa. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje osteoporoza lub jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy (które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs. Objawy reakcji z nadwrażliwości mogą obejmować gorączkę, wysypkę, obrzęk oraz czasami zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
- zapalenie jamy ustnej
- zapalenie jelita grubego
- zmiany w wynikach badań laboratoryjnych, np. zmiana stężenia sodu, cholesterolu i trójglicerydów
- bardzo ciężkie reakcje skórne przebiegające z zaczerwienieniem, tworzeniem się pęcherzy, nasilonymi zmianami zapalnymi i ciężkim uszkodzeniem skóry.
- bardzo rzadko lek Lansoprazole Genoptim może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek oraz zmniejszenie odporności pacjenta na zakażenia. W przypadku wystąpienia zakażenia, któremu towarzyszą takie objawy jak: gorączka, znaczne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka, której towarzyszą objawy miejscowego zakażenia, tj. ból gardła, krtani lub jamy ustnej lub trudności w oddawaniu moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Lekarz zleci wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia możliwego zmniejszenia ilości liczby krwinek (agranulocytoza).

Działania niepożądane o nieznanym częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- Stosowanie leku Lansoprazole Genoptim przez ponad 3 miesiące niesie ryzyko zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenia magnezu mogą powodować zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, splątanie, drgawki, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza. Małe stężenia magnezu mogą również prowadzić do obniżenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić wykonywanie regularnych badań krwi celem monitorowania stężenia magnezu.
- Wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.
- Omamy wzrokowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać Lansoprazole Genoptim

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, butelce z HDPE i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Odrywalne i nieodrywalne blistry OPA- Al-PVC/Alu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Butelka HDPE z zakrętką PP i desykanem krzemionkowym

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Okres ważności po otwarciu wynosi 6 miesięcy.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Lansoprazole Genoptim

- Substancją czynną leku jest lanzoprazol

Lansoprazole Genoptim, 15 mg kapsułki dojelitowe, twarde, to nieprzezroczyste żółte kapsułki. Każda kapsułka zawiera 15 mg lanzoprazolu

Lansoprazole Genoptim, 30 mg kapsułki dojelitowe, twarde to nieprzezroczyste białe kapsułki. Każda kapsułka zawiera 30 mg lanzoprazolu

- Pozostałe składniki to:

zawartość kapsułki: sacharoza, ziarenka (sacharoza i skrobia kukurydziana), sodu laurylosiarczan, meglumina, mannitol (E421), hypromeloza, makrogol 6000, talk, polisorbata 80, tytanu dwutlenek (E171), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%

otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171)

otoczka kapsułki 15 mg zawiera również: żółcień chinolinową (E104)

Jak wygląda lek Lansoprazole Genoptim i co zawiera opakowanie

Lanzoprazol 15 mg kapsułki dojelitowe dostępne są w opakowaniach blistrowych (odrywalne lub nieodrywalne blistry z OPA- Al-PVC/Alu) lub butelkach z HDPE z nakrętką PP i desykanem krzemionkowym zawierających po 14, 28, 30, 56, 84, 98 i 100 kapsułek.

Lanzoprazol 30 mg kapsułki dojelitowe dostępne są w opakowaniach blistrowych (odrywalne lub nieodrywalne blistry z OPA- Al-PVC/Alu) lub butelkach z HDPE z nakrętką PP i desykanem krzemionkowym zawierających po 14, 28, 30, 56, 84, 98 i 100 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa

Wytwórca:

Laboratorios Liconsa, S.A.
Avda. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia	Lansoprazole Liconsa 15/30 mg, gélules gastro-résistantes/ maagsapresistente capsules, hard/ magensaftresistente Hartkapseln
Czechy	Lanxib 15/30 mg enterosolventní tvrdá tobolka
Dania	Lansopram
Hiszpania	Lansoprazole Liconsa 15/30 mg cápsulas duras gastrorresistentes
Holandia	Lansoprazol Liconsa 15 mg maagsapresistente capsules
Irlandia	Lansoprazole Pinewood 15/30 mg gastro-resistant capsules, hard
Polska	Lansoprazole Genoptim
Rumunia	Lansoprazol Liconsa 15/30 mg capsule gastrozistentă
Słowacja	Lansoprazol Liconsa 15/30 mg gastrozistentná kapsula, tvrdá
Szwecja	Lansoprazol Medical Valley

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2017