

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Aripiprazole Teva, 5 mg, tabletki
Aripiprazole Teva, 10 mg, tabletki
Aripiprazole Teva, 15 mg, tabletki
Aripiprazole Teva, 30 mg, tabletki

Arypiprazol

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1. Co to jest lek Aripiprazole Teva i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aripiprazole Teva
3. Jak stosować lek Aripiprazole Teva
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Aripiprazole Teva
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Aripiprazole Teva i w jakim celu się go stosuje

Aripiprazole Teva zawiera substancję czynną aripiprazol i jest lekiem z grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi.

Aripiprazole Teva stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą się takimi objawami jak: widzenie, słyszenie i odczuwanie rzeczy w rzeczywistości nieistniejących, podejrzliwość, sprzeczne z rzeczywistością przekonania, chaotyczna mowa i zachowanie oraz otępienie emocjonalne. Pacjenci z powyższymi objawami mogą także odczuwać smutek, lęk lub napięcie, a także mieć poczucie winy.

Aripiprazole Teva stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 13 lat i starszej, których choroba charakteryzuje się objawami, takimi jak: silne podekscytowanie, rozpiekająca energia, mniejsze zapotrzebowanie na sen niż zwykle, bardzo szybka mowa, gonitwa myśli i czasami bardzo nasiloną drażliwość. U dorosłych, lek ten zapobiega również nawrotowi powyższych objawów u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie lekiem Aripiprazole Teva.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aripiprazole Teva

Kiedy nie stosować leku Aripiprazole Teva

- jeśli pacjent ma uczulenie na aripiprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aripiprazole Teva, należy omówić to z lekarzem prowadzącym, jeśli u pacjenta występuje:

- duże stężenie cukru we krwi (charakterystycznymi objawami są: nadmierne pragnienie, wydalanie dużych ilości moczu, zwiększenie apetytu i uczucie osłabienia) lub cukrzyca w wywiadzie rodzinnym;
- drgawki;
- mimowolne, nieregularne ruchy mięśni, szczególnie mięśni twarzy;
- choroby układu krążenia, choroba układu krążenia w wywiadzie rodzinnym, udar lub „mini” udar, nieprawidłowe ciśnienie krwi;
- zakrzepy krwi lub występowanie zakrzepów krwi w wywiadzie rodzinnym, ponieważ stosowanie leków przeciwpsychotycznych jest związane z tworzeniem zakrzepów krwi;
- uzależnienie od hazardu w przeszłości.

Jeśli pacjent stwierdzi zwiększenie masy ciała, pojawienie się nietypowych ruchów, senność, która utrudnia codzienną aktywność, jakiegokolwiek trudności w czasie połykania lub objawy alergii, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Jeśli u pacjenta w podeszłym wieku występuje demencja (utrata pamięci i innych zdolności umysłowych), to on lub jego opiekun, lub krewny powinien poinformować lekarza, czy kiedykolwiek wystąpił u pacjenta udar lub „mini” udar.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu myśli lub uczuć związanych z wyrządzaniem sobie krzywdy. W czasie leczenia aripiprazolem zgłaszano występowanie myśli i zachowań samobójczych.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje sztywność mięśni lub sztywność z wysoką gorączką, potami, zaburzeniami stanu umysłowego lub bardzo szybkie albo nieregularne bicie serca.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 13 lat. Nie wiadomo, czy stosowanie leku jest bezpieczne i skuteczne u tych pacjentów.

Lek Aripiprazole Teva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki obniżające ciśnienie krwi: Aripiprazole Teva może nasilać działanie leków obniżających ciśnienie krwi. Jeśli pacjent przyjmuje leki obniżające ciśnienie krwi, powinien powiadomić o tym lekarza prowadzącego.

Stosowanie leku Aripiprazole Teva z innymi lekami może powodować konieczność zmiany dawki leku Aripiprazole Teva. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza prowadzącego o stosowaniu następujących leków:

- leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca;
- leków przeciwdepresyjnych lub leków ziołowych stosowanych w leczeniu depresji i lęku;
- leków przeciwgrzybiczych;
- pewnych leków stosowanych w leczeniu zakażenia HIV;
- leków przeciwdrgawkowych stosowanych w leczeniu padaczki.

Leki zwiększające stężenie serotoniny: tryptany, tramadol, tryptofan, leki z grupy SSRI (takie jak paroksetyna i fluoksetyna), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak klomipramina, amitrypylina), petydyna, ziele dziurawca oraz wenlafaksyna. Leki te zwiększają ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek nietypowego objawu w czasie przyjmowania któregoś z powyższych leków jednocześnie z lekiem Aripiprazole Teva, należy skontaktować się z lekarzem.

Aripiprazole Teva z jedzeniem, piciem i alkoholem

Aripiprazole Teva można przyjmować niezależnie od posiłków.
Należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa że jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna skonsultować się z lekarzem przed zażyciem tego leku.

U noworodków, których matki stosowały Aripiprazole Teva w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane ze ssaniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.

Jeśli pacjentka przyjmuje Aripiprazole Teva, nie powinna karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn do czasu poznania wpływu leku Aripiprazole Teva na samopoczucie.

Lek Aripiprazole Teva zawiera laktozę

Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Aripiprazole Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku u dorosłych to 15 mg raz na dobę. Lekarz może jednak przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg raz na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Podawanie leku Aripiprazole Teva może być rozpoczęte od małej dawki, np. w postaci roztworu doustnego. Dawka może być stopniowo zwiększana do **zalecanej dawki dla młodzieży wynoszącej 10 mg raz na dobę.** Jednakże lekarz prowadzący może przepisać mniejszą lub większą dawkę, maksymalnie do 30 mg raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Aripiprazole Teva przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Lek Aripiprazole Teva w postaci tabletek należy przyjmować codziennie o tej samej porze. Nie ma znaczenia czy tabletkę jest przyjmowana z posiłkiem czy bez posiłku.

5 mg

Tabletkę należy połykać w całości i popijać wodą.

10/15/30 mg

Tabletkę należy popijać wodą. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Nawet jeśli odczuwa się poprawę samopoczucia, nie należy zmieniać dawki bądź zaprzestać przyjmowania Aripiprazole Teva bez wcześniejszego uzgodnienia tego z lekarzem prowadzącym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawka leku Aripiprazole Teva

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Aripiprazole Teva niż zalecił lekarz (lub jeżeli ktoś inny przyjął pewną ilość nie przeznaczoną dla niego leku Aripiprazole Teva), niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku trudności uzyskania kontaktu z lekarzem, należy udać się do najbliższego szpitala, zabierając ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie zastosowania leku Aripiprazole Teva

W przypadku pominięcia dawki pacjent powinien przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Nie należy przyjmować dwóch dawek jednego dnia.

Przerwanie stosowania leku Aripiprazole Teva

Nie wolno przerywać leczenia jeśli pacjent poczuje się lepiej.

Bardzo ważne jest aby przyjmować tabletki zgodnie z zaleceniami lekarza i przez okres zalecony przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 10 pacjentów):

- cukrzyca,
- zaburzenia snu,
- uczucie lęku,
- uczucie niepokoju i brak możliwości spokojnego siedzenia lub stania,
- niekontrolowane drżenie, ruchy z szarpnięciem lub ruchy wijące, zespół „niespokojnych nóg”,
- drżenie,
- ból głowy,
- zmęczenie,
- senność,
- uczucie pustki w głowie,
- drżenie obrazu i niewyraźne widzenie,
- zmniejszenie liczby wypróżnień lub trudności z wypróżnieniem,
- niestrawność,
- nudności,
- nadmierne wydzielanie śliny,
- wymioty,
- uczucie zmęczenia.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć 1 na 100 pacjentów):

- podwyższone stężenie prolaktyny we krwi,
- zbyt duże stężenie cukru we krwi,
- depresja,
- zmiany dotyczące seksualności lub nadmierne zainteresowanie seksem,
- niekontrolowane ruchy jamy ustnej, języka i kończyn (późna dyskineza),
- zaburzenia mięśni powodujące ruchy skręcania (dystonia),
- podwójne widzenie,
- szybkie bicie serca,
- zmniejszenie ciśnienia krwi podczas wstawania do pozycji stojącej, powodujące zawroty głowy, uczucie pustki w głowie lub omdlenie,
- czkawka.

Następujące działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu arypiprazolu w postaci doustnej, ale częstość ich występowania **nie jest znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)**:

- zmniejszona liczba białych krwinek,
- zmniejszona liczba płytek krwi,
- reakcje alergiczne (np. obrzęk jamy ustnej, języka, twarzy i gardła, świąd, pokrzywka),
- wystąpienie cukrzycy lub zaostrzenie jej przebiegu, kwasica ketonowa (obecność związków ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączka,
- za małe stężenie sodu we krwi,
- utrata apetytu (jadłowstręt),
- zmniejszenie masy ciała,
- zwiększenie masy ciała,
- myśli samobójcze, próby samobójcze i dokonane samobójstwa,
- uzależnienie od hazardu,
- uczucie agresji,
- pobudzenie,
- nerwowość,
- jednoczesne występowanie gorączki, sztywności mięśni, przyspieszonego oddechu, pocenia się, ograniczenia świadomości i nagłych zmian ciśnienia oraz zmian częstości pracy serca, omdlenia (złośliwy zespół neuroleptyczny)
- drgawki,
- zespół serotoninowy (reakcja, która może powodować uczucia wielkiej radości, ospałość, niezdolność do ruchu, niepokój, zwłaszcza ruchowy, uczucie upojenia alkoholowego, gorączkę, pocenie się lub sztywność mięśni),
- zaburzenia mowy,
- nagła niewyjaśniona śmierć,
- zagrażający życiu nieregularny rytm serca,
- atak serca (zawał mięśnia sercowego),
- wolne bicie serca,
- zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w żyłach nóg (do objawów należą obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu (jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów musi on natychmiast zgłosić się do lekarza),
- wysokie ciśnienie krwi,
- omdlenia,
- przypadkowe zachłyśnięcia pokarmem z ryzykiem wystąpienia zapalenia płuc,
- skurcz mięśni wokół głośni,
- zapalenie trzustki,
- trudności w przełykaniu,
- biegunka,
- dyskomfort w jamie brzusznej,
- dyskomfort żołądka,
- niewydolność wątroby,
- zapalenie wątroby,
- zażółcenie skóry i białych części gałek ocznych,
- nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych,
- wysypka skórna,
- nadwrażliwość na światło,
- łysienie,
- nadmierne pocenie,
- nieprawidłowy rozpad mięśni prowadzący do zaburzeń w funkcjonowaniu nerek,
- ból mięśni,

- sztywność,
- mimowolne oddawanie moczu,
- trudności w oddawaniu moczu,
- zespół abstynencyjny u noworodków w przypadku narażenia na lek w okresie ciąży,
- przedłużony i (lub) bolesny wzwód,
- trudności w regulacji podstawowej temperatury ciała lub przegrzanie,
- ból w klatce piersiowej,
- puchnięcie rąk, kostek lub stóp,
- w badaniach krwi: wahania stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia glikozylowanej hemoglobiny.

U pacjentów w podeszłym wieku z demencją przyjmujących aripiprazol opisano więcej przypadków zakończonych zgonem. Ponadto zanotowano przypadki udarów lub "mini" udarów.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

U młodzieży w wieku 13 lat i starszej występowały działania niepożądane o podobnej częstotliwości i rodzaju jak u dorosłych, z wyjątkiem senności, niekontrolowanych drgań lub nagłych, szarpiących ruchów, niepokoju ruchowego i zmęczenia, występujących bardzo często (częściej niż u 1 pacjenta na 10) oraz bólu w górnej części brzucha, suchości w jamie ustnej, przyspieszonego bicia serca, przyrostu masy ciała, zwiększenia apetytu, drżenia mięśni, niekontrolowanych ruchów kończyn oraz zawrotów głowy, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej występujących często (częściej niż u 1 pacjenta na 100).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aripiprazole Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelki

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zużyć w ciągu 6 miesięcy po pierwszym otwarciu butelki.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aripiprazole Teva

Substancją czynną leku jest aripiprazol.

Każda tabletką zawiera odpowiednio 5, 10, 15 lub 30 mg aripiprazolu.

Ponadto lek zawiera laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, żelaza tlenek żółty (E172) (tylko tabletki 5 mg i 15 mg), żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko tabletki 10 mg i 30 mg), hydroksypropylocelulozę, kroskarmelozę sodową, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Aripiprazole Teva i co zawiera opakowanie

Aripiprazole Teva, 5 mg

Jasnożółte, okrągłe, płaskie tabletki o ściętych krawędziach z wytłoczonym napisem "5" po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Aripiprazole Teva, 10 mg

Różowe do jasnoróżowych, podłużne tabletki z wytłoczonym napisem "10" na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Aripiprazole Teva, 15 mg

Jasnożółte, okrągłe, płaskie tabletki ze ściętymi brzegami z wytłoczonym napisem "15" na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Aripiprazole Teva, 30 mg

Różowe do jasnoróżowych, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki z wytłoczonym napisem "30" na jednej stronie i linią podziału na drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Aripiprazole Teva, 5 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających po 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 15, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56 x 1, 60, 98, 98 x 1 i 100 tabletek.

Aripiprazole Teva, 10 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających po 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56 x 1, 60, 98, 98 x 1 i 100 tabletek.

Aripiprazole Teva, 15 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających po 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56 x 1, 60, 98, 98 x 1 i 100 tabletek.

Aripiprazole Teva, 30 mg jest dostępny w opakowaniach zawierających po 7, 7 x 1, 14, 14 x 1, 28, 28 x 1, 30, 49, 56, 56 x 1, 60, 98, 98 x 1 i 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Wytwórca

1) Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Niemcy

- 2) Teva Pharma B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandia
- 3) Pliva Hrvatska d.o.o
Prilaz baruna Filipovica 25
1000 Zagreb
Chorwacja
- 4) Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
- 5) Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000,
Malta

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

5 mg

Belgium:	Aripiprazole Teva 5 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Croatia:	Aripiprazol Pliva 5 mg tablete
Denmark:	Aripiprazole Teva
Estonia:	Aripiprazole Teva
France:	Aripiprazole Teva Santé 5 mg comprimé
Germany:	Aripiprazol AbZ 5 mg Tabletten
Hungary:	Aripiprazol-Teva 5 mg tableta
Ireland:	Aripiprazole Teva 5mg Tablets
Italy:	Aripiprazolo Teva
Malta:	Aripiprazole Teva 5mg Tablets
Norway:	Aripiprazole Teva
Poland:	Aripiprazole Teva
Spain:	Aripiprazol Teva 5 mg comprimidos EFG
Sweden:	Aripiprazole Teva
United Kingdom:	Aripiprazole Teva 5mg Tablets

10 mg

Belgium:	Aripiprazole Teva 10 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Croatia:	Aripiprazol Pliva 10 mg tablete
Czech Republic:	Aripiprazole Teva 10 mg
Denmark:	Aripiprazole Teva
Estonia:	Aripiprazole Teva
France:	Aripiprazole Teva Santé 10 mg comprimé
Germany:	Aripiprazol AbZ 10 mg Tabletten
Hungary:	Aripiprazol-Teva 10 mg tableta
Ireland:	Aripiprazole Teva 10mg Tablets
Italy:	Aripiprazolo Teva
Latvia:	Aripiprazole Teva 10 mg tabletes
Lithuania:	Aripiprazole Teva 10 mg tabletės
Malta:	Aripiprazole Teva 10mg Tablets
Netherlands:	Aripiprazol Teva 10 mg, tabletten
Norway:	Aripiprazole Teva
Poland:	Aripiprazole Teva
Portugal:	Aripiprazol Teva
Romania:	ARIPIPRAZOL TEVA 10 mg comprimate

Slovenia: Aripiprazol Teva 10 mg tablete
Spain: Aripiprazol Teva 10 mg comprimidos EFG
Sweden: Aripiprazole Teva
United Kingdom: Aripiprazole Teva 10mg Tablets

15 mg

Belgium: Aripiprazole Teva 15 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Bulgaria: Aripiprazole TEVA 15mg tablet
Croatia: Aripiprazol Pliva 15 mg tablete
Czech Republic: Aripiprazole Teva 15 mg
Denmark: Aripiprazole Teva
Estonia: Aripiprazole Teva
France: Aripiprazole Teva Santé 15 mg comprimé
Germany: Aripiprazol AbZ 15 mg Tabletten
Hungary: Aripiprazol-Teva 15 mg tableta
Ireland: Aripiprazole Teva 15mg Tablets
Italy: Aripiprazolo Teva
Latvia: Aripiprazole Teva 15 mg tabletes
Lithuania: Aripiprazole Teva 15 mg tabletės
Malta: Aripiprazole Teva 15mg Tablets
Netherlands: Aripiprazol Teva 15 mg, tabletten
Norway: Aripiprazole Teva
Poland: Aripiprazole Teva
Portugal: Aripiprazol Teva
Romania: ARIPIPRAZOL TEVA 15 mg comprimate
Slovakia: Aripiprazol Teva 15mg tablety
Slovenia: Aripiprazol Teva 15 mg tablete
Spain: Aripiprazol Teva 15 mg comprimidos EFG
Sweden: Aripiprazole Teva
United Kingdom: Aripiprazole Teva 15mg Tablets

30 mg

Belgium: Aripiprazole Teva 30 mg tabletten/comprimés/Tabletten
Croatia: Aripiprazol Pliva 30 mg tablete
Denmark: Aripiprazole Teva
Germany: Aripiprazol AbZ 30 mg Tabletten
Hungary: Aripiprazol-Teva 30 mg tableta
Ireland: Aripiprazole Teva 30mg Tablets
Malta: Aripiprazole Teva 30mg Tablets
Netherlands: Aripiprazol Teva 30 mg, tabletten
Norway: Aripiprazole Teva
Poland: Aripiprazole Teva
Romania: ARIPIPRAZOL TEVA 30 mg comprimate
Sweden: Aripiprazole Teva
United Kingdom: Aripiprazole Teva 30mg Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2017 r.