

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

## **Colocynthis-Homaccord**

**krople doustne, roztwór**

---

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Colocynthis-Homaccord i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Colocynthis-Homaccord
3. Jak przyjmować lek Colocynthis-Homaccord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Colocynthis-Homaccord
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### **1. Co to jest lek Colocynthis-Homaccord i w jakim celu się go stosuje**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Colocynthis-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa.

### **2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Colocynthis-Homaccord**

#### **Kiedy nie przyjmować leku Colocynthis-Homaccord**

- jeśli pacjent ma stwierdzone uczulenie na którąkolwiek substancję czynną lub na substancję pomocniczą zawartą w leku (wymienioną w punkcie 6)

#### **Dzieci i młodzież**

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 12 lat.

#### **Colocynthis-Homaccord a inne leki**

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane były bez recepty. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### **Stosowanie Colocynthis-Homaccord z jedzeniem i piciem**

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Colocynthis-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn**

W zalecanych dawkach nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

### **Colocynthis-Homaccord zawiera etanol**

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

### **3. Jak przyjmować lek Colocynthis-Homaccord**

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **Zalecana dawka**

Dorośli i młodzież od 12 lat

Zwykle po 10 kropli 3 razy dziennie.

#### **Sposób stosowania**

Doustnie.

Krople można zmieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

#### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Colocynthis-Homaccord**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **Pominięcie przyjęcia leku Colocynthis-Homaccord**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

#### **Przerwanie przyjmowania leku Colocynthis-Homaccord**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Colocynthis-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

#### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań produktów Lekniczych Urzędu Rejestracji Produktów Lekniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl).

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

#### **5. Jak przechowywać lek Colocynthis-Homaccord**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: *Termin ważności*. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

##### **Co zawiera lek Colocynthis-Homaccord**

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Colocynthis-Homaccord są:

0,8 g	Citrullus colocynthis	D4
0,8 g	Citrullus colocynthis	D10
0,8 g	Citrullus colocynthis	D30
0,8 g	Citrullus colocynthis	D200
0,2 g	Gnaphalium polycephalum	D4
0,2 g	Gnaphalium polycephalum	D10
0,2 g	Gnaphalium polycephalum	D30
0,2 g	Gnaphalium polycephalum	D200

Pozostałe składniki : etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (v/v) etanolu.

##### **Jak wygląda lek Colocynthis-Homaccord i co zawiera opakowanie**

Colocynthis-Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

Adres:...

tel.....

e-mail: .....

Data zatwierdzenia tekstu ulotki:

Logo firmy: **-Heel**

Kod opakowania: