

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
ULOTKA DLA PACJENTA**

POJEMNIK ALUMINIOWY

Panthenol Spray

(Dexpanthenolum)

Aerazol do stosowania zewnętrznego, 46,3 mg/g

Skład:

1 g aerozolu zawiera 46,3 mg dekspantenolu

oraz substancje pomocnicze: alkohol cetylostearylowy, płynna parafina, płynny wosk, woda oczyszczona, kwas nadoctowy, gaz wytłaczający (propan, n-butan, izobutan)

130 g

Co to jest Panthenol Spray i w jakim celu się go stosuje

Lek Panthenol Spray zawiera substancję czynną dekspantenol. Poprawia gojenie, zwiększa elastyczność i nawilżenie skóry.

Panthenol Spray jest stosowany wspomagająco w leczeniu drobnych uszkodzeń skóry (oparzenia słoneczne, uszkodzenia i otarcia naskórka, powierzchniowe rany), suchej skóry, wyprzeń, zapaleń skóry, opryszczki wargowej, chorób pęcherzowych skóry z ubytkami naskórka.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panthenol Spray

Kiedy nie stosować leku Panthenol Spray:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- zmiany dotyczą oka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli lek jest stosowany w okolicach twarzy, nie powinien być stosowany bezpośrednio. Lek należy rozpylić na dłoń i rozprowadzić w miejscu urazu na twarzy.

Nie stosować na oczy. Nie stosować bezpośrednio do ust i jamy nosowej.

Podczas stosowania leku u pacjentów chorych na astmę i schorzenia oskrzeli i płuc, należy uważać, aby pacjent nie wdychał nośnika, co może wywołać podrażnienie błony śluzowej lub wywołać atak astmy.

U dzieci lek powinien być stosowany tylko pod nadzorem dorosłych.

Inne leki i Panthenol Spray

Jeśli lek Panthenol Spray jest stosowany w okolicach narządów płciowych lub odbytu i w tym samym czasie są używane prezerwatywy, wytrzymałość prezerwatyw może zostać obniżona z powodu zawartości parafiny w produkcie. Skuteczność stosowania prezerwatyw może zostać zmniejszona.

Jak stosować lek Panthenol Spray

Stosować na uszkodzoną powierzchnię raz lub kilka razy na dobę.

Pojemnik należy trzymać pionowo z główką na górze.

Przed każdym użyciem należy mocno wstrząsnąć pojemnik, szczególnie jeśli produkt nie był ostatnio używany.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcja nadwrażliwości w miejscu zastosowania może wystąpić w pojedynczych przypadkach.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione powyżej, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać lek Panthenol Spray

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić od promieni słonecznych i temperatury powyżej 50°C. Nie podejmować prób otwarcia pustego pojemnika. Nie wrzucać pojemnika do ognia nawet po zużyciu zawartości. Usunąć opakowanie można dopiero po całkowitym opróżnieniu z gazu. Zabrania się kierowania strumienia aerozolu w kierunku otwartego ognia i żarzących się przedmiotów. Przechowywać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów trakcie stosowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

W przypadku stosowania w słabo przewietrzonych pomieszczeniach istnieje niebezpieczeństwo powstania mieszanki wybuchowej.

Uwaga: Produkt łatwopalny.



Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praga 7

Republika Czeska

Wytwórca:

Dr. Gerhard Mann

Chem.-Pharm Fabrik GmbH

Brunsbuetteler Damm

165 –173 13581 Berlin

Niemcy

Pozwolenie nr R/2880

Nr serii:

Kod 5909990288014

Logo Bausch& Lomb

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A
Panthenol Spray