

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować PROSTALIZYNĘ ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Dłuższe stosowanie wymaga konsultacji z lekarzem.
- Jeżeli objawy nasiliły się lub nie ustąpiły należy skontaktować się z lekarzem.

PROSTALIZYNA

Pasta doustna

Skład:

Substancja czynna: *Urticae radices extractum fluidum* (1:1; etanol 70^o) – 83,1 g

Substancje pomocnicze: Gliceryna, Karagen, Benzoosan sodu, Olejek pomarańczowy – do 100 g
1 g preparatu zawiera nie mniej niż 1 mg związków sterolowych w przeliczeniu na β – sitosterol.

Zawartość opakowania: 100 g

Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”

05-800 Pruszków

ul. Olówkowa 54

tel. (48 22) 738 13 00

Spis treści ulotki:

1. Co to jest PROSTALIZYNA i w jakim celu się ją stosuje?
2. Zanim zastosuje się PROSTALIZYNĘ:
3. Jak stosować PROSTALIZYNĘ:
4. Możliwe działania niepożądane:
5. Przechowywanie PROSTALIZYNY:
6. Inne informacje:

1. Co to jest PROSTALIZYNA i w jakim celu się ją stosuje?

PROSTALIZYNA jest pastą doustną, zawierającą wyciąg z korzenia pokrzywy.

PROSTALIZYNA łagodzi objawy związane z łagodnym przerostem gruczołu krokowego.

Jest stosowana tradycyjnie w podanych poniżej wskazaniach, a jej skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

PROSTALIZYNA stosowana jest wspomagająco w zaburzeniach oddawania moczu występujących we wczesnych stadiach przerostu gruczołu krokowego:

- częste oddawanie moczu,
- konieczność oddawania moczu w nocy,
- utrudnione oddawanie moczu.

2. Zanim zastosuje się PROSTALIZYNĘ:

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15

Rozpoznanie przerostu gruczołu krokowego musi ustalić lekarz (objawy przerostu gruczołu krokowego mogą być podobne do objawów nowotworu gruczołu krokowego).

Nie należy stosować leku:

- przy alergii na składniki preparatu,
- u osób ze stwierdzonym nowotworem gruczołu krokowego.

Zachować szczególną ostrożność stosując PROSTALIZYNĘ, gdyż:

Stosowanie pasty nie zwalnia pacjenta od stałej konsultacji z urologiem. Preparat nie hamuje wzrostu gruczołu krokowego, łagodzi jedynie dolegliwości z nim związane. Jeżeli podczas stosowania preparatu objawy nasilą się lub pojawią się nowe, stwierdzi się np. obecność krwi w moczu lub nastąpi nagle zatrzymanie moczu należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym PROSTALIZYNA nie przekracza 100 mg na dawkę jednorazową, dlatego też stosowanie w zalecanych dawkach nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Stosowanie innych leków:

Interakcje z innymi lekami nieznane.

3. Jak stosować PROSTALIZYNĘ:

Doustnie: 3 razy na dobę po 1 łyżeczce (ok. 5 g) pasty rozpuszczonej w ½ szklanki przegotowanej wody.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana:

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania.

4. Możliwe działania niepożądane:

Niekiedy mogą wystąpić łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe

5. Przechowywanie PROSTALIZYNY:

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować po upływie terminu ważności.

6. Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data opracowania ulotki: czerwiec 2008 r.

2008 -08- 14

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15