

Ulotka dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować REUMACOR ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

REUMACOR

Extractum compositum siccum ex Salicis cortice, Solidaginis herba
tabletki powlekane

Jedna tabletkę powlekana zawiera:

Substancja czynna:

Extractum compositum siccum ex Salicis cortice, Solidaginis herba (4-6:1) - 181,800 mg
[Ekstrahent etanol 40 (v/v)]

Substancje pomocnicze:

Celuloza mikrokrystaliczna, sól sodowa karboksymetyloskrobi, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, stearynian magnezu, Aqua Polish white 010, tlenek żelaza żółty (E 172)

Jedna tabletkę powlekana zawiera 18-22 mg sumy glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę.

Dostępne opakowania: 30 i 60 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek REUMACOR i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się lek REUMACOR
3. Jak stosować lek REUMACOR
4. Możliwe działania niepożądane
5. Przechowywanie leku REUMACOR
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku REUMACOR

1. Co to jest lek REUMACOR i w jakim celu się go stosuje

Lek Reumacor zawiera wyciąg z kory wierzby i ziela nawłoci.

Wyciąg z kory wierzby, ze względu na zawartość salicylanów ma działanie przeciwzapalne i przeciwgorączkowe.

Związki flawonoidowe zawarte w ziele nawłoci działają łagodnie moczopędnie, co jest korzystne w schorzeniach reumatycznych.

Wskazania do stosowania:

Reumacor stosuje się w łagodnych bólach reumatycznych, bólach głowy i pomocniczo w chorobach przebiegających z gorączką.

2. Zanim zastosuje się lek REUMACOR

Nie należy stosować leku Reumacor:

- w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na salicylany (astma, skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka)
- u pacjentów z nadwrażliwością na inne leki z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych
- w przypadku astmy, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli

Zachować szczególną ostrożność stosując Reumacor:

W przypadkach ciężkich chorób wątroby lub nerek, zaburzeń krzepliwości krwi, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, Reumacor powinien być stosowany pod kontrolą lekarza. W przypadku gorączki utrzymującej się powyżej 3 dni leczenia lub przekraczającej 39° C, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania Reumacoru w przypadku obrzęku, zaczerwienienia i ograniczonej ruchomości stawów. Jeśli ból i inne objawy nie ustępują lub nasilają się w ciągu pierwszego tygodnia leczenia należy skonsultować się z lekarzem

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Reumacor:

Lek zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży, w związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu w tym okresie.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Nie wykonano kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie karmienia piersią, w związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Reumacor może nasilać działanie antykoagulantów (heparyny, pochodnych kumaryny).

3. Jak stosować lek REUMACOR

Doustnie, dorośli: 3 do 4 razy na dobę po 2 tabletki powlekane.

Lek należy zażywać po jedzeniu, popijając dużą ilością płynu.

Maksymalna dawka dobową wynosi 240 mg glikozydów fenolowych w przeliczeniu na salicynę, co odpowiada 12 tabletkom powlekany.

W przypadku zażycia większej dawki leku Reumacor niż zalecana:

Nie opisano przypadków przedawkowania.

W przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. *Możliwe działania niepożądane*

Działania niepożądane leku mogą wystąpić pod postacią reakcji alergicznych, takich jak wysypka, świąd, pokrzywka, astma oraz zaburzeń żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty, zgaga, ból brzucha, biegunka. Częstość występowania tych objawów nie jest znana.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem.

5. *Przechowywanie leku REUMACOR*

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. *Inne informacje*

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego - tel. (071) 321-86-04 wew.123

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Data nowelizacji ulotki:

2008 -11- 05

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
00-952 Warszawa 3
ul. Miodowa 15