

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

## **Cimicifuga-Homaccord**

**krople doustne, roztwór**

---

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### **Spis treści ulotki:**

1. Co to jest lek Cimicifuga-Homaccord i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cimicifuga-Homaccord
3. Jak przyjmować lek Cimicifuga-Homaccord
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Cimicifuga-Homaccord
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### **1. Co to jest lek Cimicifuga-Homaccord i w jakim celu się go stosuje**

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Cimicifuga-Homaccord jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagająco w łagodnych bólach mięśniowo-stawowych, zwłaszcza w okolicy szyi i barków.

Uwaga:

Jeżeli objawy utrzymują się, nasilą lub pojawia się nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarskiej.

### **2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cimicifuga-Homaccord**

#### **Kiedy nie przyjmować leku Cimicifuga-Homaccord**

- jeśli pacjent ma stwierdzoną nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną np. pluskwicę groniastą lub pozostałe składniki leku (wymienione w punkcie 6)
- pacjentki z obecnymi lub przebytymi nowotworami estrogenozależnymi nie powinny przyjmować tego leku

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Osoby, u których stwierdzono choroby wątroby lub padaczkę powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cimicifuga-Homaccord. Lek jest szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.

### **Dzieci i młodzież**

Ze względu na brak wystarczająco udokumentowanych danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

### **Cimicifuga-Homaccord a inne leki**

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

### **Stosowanie Cimicifuga-Homaccord z jedzeniem i piciem**

Tak jak wszystkie homeopatyczne produkty lecznicze, lek Cimicifuga-Homaccord powinien być przyjmowany pomiędzy posiłkami.

### **Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność**

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Brak danych na temat wpływu na płodność.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn**

Nie zanotowano wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

### **Cimicifuga-Homaccord zawiera etanol:**

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu (alkoholu), co stanowi 150,2 mg/dawkę (10 kropli). Jest to równoważne 3 ml piwa lub 1,27 ml wina. (Jako przelicznik przyjęto piwo zawierające 5% alkoholu oraz wino zawierające 12% alkoholu). Szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy zachować ostrożność w przypadku kobiet ciężarnych, karmiących, dzieci oraz osób z chorobami wątroby lub padaczką.

## **3. Jak przyjmować lek Cimicifuga-Homaccord**

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Zalecana dawka**

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat:  
zwykle po 5-10 kropli do 3 razy dziennie.

### **Sposób stosowania**

Krople można mieszać z niewielką ilością wody.

Lek należy przyjmować pomiędzy posiłkami.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

### **Czas stosowania**

Nie należy stosować dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem.

### **Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cimicifuga-Homaccord**

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Pominięcie przyjęcia leku Cimicifuga-Homaccord**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## **Przerwanie przyjmowania leku Cimicifuga-Homaccord**

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, Cimicifuga-Homaccord może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

### Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, zwłaszcza sugerujących uszkodzenie wątroby (uczucie nadmiernego zmęczenia, utrata apetytu, zażółcenie skóry, zażółcenie oczu i błon śluzowych, bóle brzucha z nudnościami i wymiotami lub ciemna barwa moczu) należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:  
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, faks: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl).

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Cimicifuga-Homaccord**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek ten nie ma specjalnych wymagań odnośnie warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku po: *Termin ważności*. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Cimicifuga-Homaccord**

Substancjami czynnymi w 100g roztworu Cimicifuga-Homaccord są:

0,8 g	Cimicifuga racemosa	D2
0,8 g	Cimicifuga racemosa	D10
0,8 g	Cimicifuga racemosa	D30
0,8 g	Cimicifuga racemosa	D200
0,2 g	Strontium carbonicum	D8
0,2 g	Strontium carbonicum	D30
0,2 g	Strontium carbonicum	D200

Pozostałe składniki: etanol, woda oczyszczona.

Lek zawiera 35% (V/V) etanolu.

**Jak wygląda lek Cimicifuga-Homaccord i co zawiera opakowanie**

Cimicifuga-Homaccord jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o zapachu etanolu.

Krople znajdują się w butelce ze szkła barwnego, z kroplomierzem i zakrętką, umieszczonej w pudełku tekturowym. Butelka zawiera 30 ml roztworu.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Niemcy

tel. 0049 7221 501 00, faks: 0049 7221 501 210

e-mail: info@heel.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Heel Polska Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21

02-822 Warszawa

tel. +48 (22) 545 07 15

e-mail: biuro@heel.pl

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: *mm/rr*

logo **-Heel**

Kod opakowania