

## **Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta**

### **Soligardin**

*proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła  
produkt złożony*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### **Spis treści ulotki**

1. Co to jest lek Soligardin i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Soligardin
3. Jak stosować lek Soligardin
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Soligardin
6. Zawartość opakowania i inne informacje

#### **1. Co to jest lek Soligardin i w jakim celu się go stosuje**

Soligardin to proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła.

Lek ma działanie odkażające, ściągające, przeciwzapalne i miejscowo przeciwbólowe.

Działa hamująco na rozwój infekcji wirusowych i przeciwgrzybiczo.

#### **Wskazania do stosowania**

Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych, anginy, infekcji wirusowych i zakażeń grzybiczych.

#### **2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Soligardin**

##### **Kiedy nie należy stosować leku Soligardin**

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjent ma uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych.

##### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Soligardin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas płukania gardła należy uważać aby nie połykać leku. Przy zastosowaniu leku na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych istnieje możliwość kumulowania związków boru w organizmie, zwłaszcza u małych dzieci.

##### **Lek Soligardin a inne leki**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki powodujące przekrwienie błon śluzowych mogą zwiększać prawdopodobieństwo wchłaniania składników leku do krążenia ogólnego.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

## **3. Jak stosować lek Soligardin**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować zewnętrznie, podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

### **Zalecana dawka to:**

Należy dodać ½ łyżeczki (lub 1 saszetka) do 1 łyżeczki (lub 2 saszetki) do ½ szklanki ciepłej wody, roztworem płukać jamę ustną i gardło 3 razy na dobę.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Soligardin**

W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

### **Pominięcie zastosowania leku Soligardin**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, kolejną należy zastosować jak najszybciej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane chociaż nie u każdego one wystąpią.

### **Mogą wystąpić następujące działania niepożądane**

- brak łaknienia, wymioty, biegunka, śluzowo-krwawe wymioty;
- bezmocz;
- wysypka skórna, wyłysienie;
- niedokrwistość;
- gorączka.

### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **5. Jak przechowywać lek Soligardin**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu słoika - 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

### **Co zawiera lek Soligardin**

- Substancjami czynnymi leku są boraks, sodu wodorowęglan, sodu chlorek, sodu benzoesan, mentol.
- 100 g proszku zawiera: 34,8 g boraksu, 34,8 g sodu wodorowęglanu, 14,9 g sodu chlorku, 14,9 g sodu benzoesanu, 0,5 g mentolu.

### **Jak wygląda Soligardin i co zawiera opakowanie**

Lek ma postać proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła.

Opakowanie leku to:

- słoik ze szkła brązowego zawierający 30 g leku, w tekturowym pudełku;
- lub 12 saszetek zawierających po 2,5 g leku, w tekturowym pudełku.

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

### **Data ostatniej aktualizacji ulotki**