

**Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta****Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C, 1,2 mg + 0,6 mg + 100 mg, pastylki twarde**  
*Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum + Acidum ascorbicum*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem .

**Spis treści ulotki**

1. Co to jest Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C
3. Jak stosować Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C
6. Zawartość opakowania i inne informacje

**1. Co to jest Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C i w jakim celu się go stosuje**

Lek Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C zawiera:

- dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym
- kwas askorbowy (witaminę C) – uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Uzupełnia też zwiększone zapotrzebowanie na tę witaminę w stanach przeziębienia i grypy.

Lek Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

**2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C****Kiedy nie stosować leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

- cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów),
- nietolerancja niektórych cukrów.

**Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C a inne leki**

Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C z innymi lekami.

**Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

**Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C zawiera****Żółcień pomarańczową (E110) i czerwień koszenilową (E124)**

Lek może powodować reakcje alergiczne.

**Glukozę i sacharozę**

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

**3. Jak stosować Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2 - 3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C**

Przedawkowanie nie powinno być przyczyną innych zaburzeń niż dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Należy zastosować leczenie objawowe.

**Pominięcie zastosowania leku Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej, bolesność języka.

**Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl)

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.  
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## 5. Jak przechowywać Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## 6. Zawartość opakowania i inne informacje

### Co zawiera Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C

- Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i witamina C. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 100 mg witaminy C.
- Pozostałe składniki to: esencja pomarańczowa, kwas winowy, lewomentol, glikol propylenowy, żółcień pomarańczowa (E110), czerwień koszenilowa (E124), sacharoza i glukoza.

### Jak wygląda Strepsils Immuno na Gardło z Witaminą C i co zawiera opakowanie

Pomarańczowa, okrągła pastylka twarda o smaku pomarańczowym.

Opakowanie zawiera 8, 12, 24 lub 36 pastylek twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

### Podmiot odpowiedzialny i wytwórca/importer

#### Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

ul. Okunin 1

05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki

tel. 801 88 88 07

#### Wytwórca:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham site

Thane Road

Nottingham NG90 2DB

Wielka Brytania

#### Importer:

RB NL Brands B.V.

WTC Schiphol Airport,

Schiphol Boulevard 207,

1118 BH Schiphol,

Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2019